

Flora vascular de la cordillera de Putaendo (32° S, 70° O): Andes escasamente estudiados y amenazados de la Región de Valparaíso, Chile Central

Vascular flora of the Putaendo mountain range (32° S, 70° W): scarcely studied and threatened Andes of the Valparaíso Region, Central Chile

Arón Cádiz-Véliz^{1,2*}, Patricio Novoa Quezada³ & Andrés Moreira-Muñoz⁴

¹Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Calle Víctor Lamas 1290, Concepción, Chile.

²Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Calle Víctor Lamas 1290, Concepción, Chile.

³Jardín Botánico Nacional, Camino El Olivar 305, El Salto, Viña del Mar, Chile.

⁴Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Av. Brasil 2241, Valparaíso, Chile.

*E-mail: aron.cadiz.veliz@gmail.com

RESUMEN

La cordillera de Putaendo se ubica en los Andes de Valparaíso y existen escasos estudios acerca de su flora y vegetación, lo cual es una limitante para la evaluación del estado de conservación de este ambiente que posee una diversidad de usos en algunos casos en conflicto. Se llevó a cabo un inventario de especies mediante 15 campañas de terreno, entre los años 2016-2022, entre los meses de octubre y marzo, en las tres cuencas principales: río Rocín, río Hidalgo y estero Chalaco. Como resultado se obtuvo un registro de 501 taxa distribuidos en 77 familias y 240 géneros. La flora reportada representa un 26,5 % de la flora de la Región de Valparaíso. Las familias con mayor riqueza son Asteraceae, Fabaceae, Poaceae y Calceolariaceae. Nueve géneros son endémicos de Chile. De acuerdo con su estatus fitogeográfico, 318 (64 %) son nativas, 161 (32 %) son endémicas de Chile y 22 (4 %) son alóctonas. El 71 % de los taxa son herbáceas y el 29 % son leñosas. La mayor riqueza y grado de endemismo se registró entre los 1100-2500 m.s.m. Se reportan ocho especies amenazadas, 45 nuevos taxones para la región de Valparaíso y 34 nuevos límites de distribución de especies. Finalmente, se presenta la lista de especies microendémicas y aquellas que son escasas en el área de estudio, o poco representadas en los herbarios de referencia.

Palabras clave: diversidad de plantas, ecosistemas mediterráneos, flora andina, hotspot chileno, taxonomía.

ABSTRACT

The Putaendo mountain range is located in the Andes of Valparaíso and there are few studies on its flora and vegetation, which is a limitation for the evaluation of the conservation status of this environment that has a diversity of uses, in some cases in conflict. A species inventory was carried out through 15 field campaigns, between 2016-2022, between the months of October and March, in the three main watersheds: Rocín river, Hidalgo river and Chalaco estuary. As a result, a record of 501 taxa distributed in 77 families and 240 genera was obtained. The flora reported represents 26.5 % of the flora of the Valparaíso Region. The richest families are Asteraceae, Fabaceae, Poaceae and Calceolariaceae. Nine genera are endemic to Chile. According to their phytogeographic status, 318 (64 %) are native, 161 (32 %) are endemic to Chile and 22 (4 %) are allochthonous. Seventy-one percent of the taxa are herbaceous

and 29 % are woody. The highest richness and degree of endemism was recorded between 1100-2500 m.a.s.l. Eight threatened species are reported, 45 new taxa are reported for the Valparaíso region and 34 new species distribution limits. Finally, the list of microendemic species and those that are scarce in the study area or poorly represented in reference herbaria is reported.

Keywords: Andean flora, Chilean hotspot, mediterranean ecosystems, plant diversity, taxonomy.

INTRODUCCIÓN

Los ambientes de montaña atraen cada vez más las investigaciones sobre los efectos del cambio climático a distintas escalas (Báez et al. 2016; Fuentes-Castillo et al. 2020). Al mismo tiempo, constituyen reservorios fundamentales de la biodiversidad global y se consideran como una pieza clave para la sustentabilidad debido a su provisión de servicios ecosistémicos, sin embargo, son sensibles a las perturbaciones humanas (Feeley & Silman 2010; Seddon et al. 2016; Cavieres et al. 2021; Giorgis et al. 2021). Uno de los sistemas montañosos más interesantes debido a sus condiciones topográficas, evolución y biodiversidad, es la cordillera de los Andes, que hoy se encuentra en el foco de los estudios de biogeografía asociados al cambio climático y las posibles adaptaciones y alteraciones de distribución que están sufriendo tanto los ambientes en su conjunto como sus componentes individuales, ya sean estos, plantas, insectos, hongos y vertebrados (Cuesta et al. 2020; Moreira-Muñoz et al. 2020; Perrigo et al. 2020; Tovar et al. 2020).

Se considera que la cordillera de los Andes puede influir de diferentes maneras los procesos evolutivos de grupos bióticos o ecosistemas, pues funciona como: a) corredor de dispersión para algunos grupos bióticos; b) como barrera biogeográfica, especialmente en Chile Central donde alcanza las mayores alturas como el monte Aconcagua (6960 m.s.m.); c) y como espacio de diversificación a partir de la geodiversidad, (i.e. sustrato, suelos, topografía, exposición) y condiciones microclimáticas que promueven la especiación (Mihoc et al. 2006; Luebert & Weigend 2014; Esquerre et al. 2019). En este sentido, resulta particularmente interesante estudiar los Andes a la latitud de Chile mediterráneo (entre los 26° a 37° S), donde alcanza las máximas alturas y los procesos de aislamiento de la biota son más intensos (Scherson et al. 2017). Entre otros factores, ello influye para que Chile central sea considerado un hotspot de biodiversidad debido a su alto grado de endemismo de plantas vasculares que alcanza el 46 % y porque ha perdido más del 70% de la vegetación original por actividades antrópicas (Mittermeier et al. 2011; Madrid et al. 2018; Rodríguez et al. 2018).

Las áreas con clima mediterráneo cubren sólo el 2 % de la superficie terrestre (Cowling et al. 1996), sin embargo, contienen más del 20 % de los taxones de plantas vasculares conocidos, muchos de los cuales son escasos y/o de distribución restringida (Cox & Underwood 2011; Cádiz-Véliz et al. 2022). El área mediterránea de Chile es parte del hotspot denominado *Chilean Winter Rainfall-Valdivian Forests*, el que se extiende desde la costa del Pacífico, hasta las cumbres de la cordillera de los Andes, entre los 25 y 47° S (Myers et al. 2000; Arroyo et al. 2008) y concentra la mayor parte de la riqueza de plantas vasculares entre los 30-40° S (Bannister et al. 2012). Sin embargo, menos del 1 % de su superficie está protegida (Pliscoff & Fuentes-Castillo 2008; Flores-Toro 2012). La Región de Valparaíso se ubica entre los 31-33° S, y carga con una larga historia de intervención y reemplazo de sus ecosistemas por actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras, incendios forestales y expansión urbana (Cox & Underwood 2011; Madrid et al. 2018), y su vegetación remanente se encuentra escasamente representada dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) (Pliscoff & Fuentes-Castillo 2008; Madrid et al. 2018).

Durante al menos medio siglo se han realizado importantes contribuciones al conocimiento de la flora y vegetación de la Región de Valparaíso (e.g., Villaseñor 1980; Villaseñor & Serey 1980; San Martín et al. 2001; Luebert et al. 2009; Luebert & Muñoz-Schick 2005; Villagrán et al. 2007; Flores-Toro & Aguirre-Saavedra 2008; Hauenstein et al. 2009; Lund & Teillier 2012; Flores-Toro & Amigo 2013; Novoa & Matus 2013; Madrid et al. 2018; Madrid & Teillier 2021; von Bohlen et al. 2022), sin embargo, los Andes de la Región de Valparaíso se ha mantenido insuficientemente documentada en términos florísticos (Luebert & Gajardo 2004) y los pocos estudios realizados se han concentrado en describir la vegetación a grandes rasgos (e.g., Quintanilla 1978, Luebert & Gajardo 2004). Es necesario realizar exploraciones en las áreas geográficas de las que se tiene escasa información para proponer estrategias para su conservación (Prina & Alfonso 2002).

La cordillera de Putaendo (Región de Valparaíso) se

encuentra en la vertiente pacífica de la cordillera de los Andes entre los 32-33° S, y corresponde a un vasto territorio ubicado en la zona alta de la cuenca homónima. El área es de sumo interés científico por su nivel de endemismo (Luebert & Gajardo 2004; Novoa 2016), por la presencia de numerosos glaciares de roca (Monnier & Kinnard 2015; Fernández & Ferrando 2018) y por contener el ecotono entre el macrobioclima Tropical y el macrobioclima Mediterráneo (Di Castri & Hajek 1976; Moreira-Muñoz 2011, Luebert & Pliscoff 2012), sin embargo, esta área ha sido particularmente poco explorada debido a su difícil acceso (Luebert & Gajardo 2004), por lo que ha sido considerada como los últimos Andes inexplorados y menos intervenidos de la Región de Valparaíso. No obstante, esta zona se enfrenta a la instalación de grandes proyectos mineros, incendios forestales, ganadería, turismo no regulado, a la sequía y aumento de temperaturas producto del cambio climático (Luebert & Pliscoff 2012; Novoa 2016; Fernández & Ferrando 2018; Cádiz-Véliz & Aliaga-Reyes 2019; Palmisano 2020).

El objetivo de este estudio es contribuir al conocimiento de la flora vascular de la cordillera de Putaendo con el fin

de realizar un inventario de especies, indicando su estatus fitogeográfico, distribución por regiones en Chile, forma de vida y categoría de conservación. Además de hacer observaciones sobre algunos hallazgos interesantes desde el punto de vista de la biogeografía y la conservación.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

La cordillera de Putaendo (Provincia de San Felipe) corresponde a los Andes de la Región de Valparaíso, que se encuentra en la provincia fitogeográfica Cuyano-Pikumche (Biganzoli *et al.* 2022), ubicada en el tramo de los Andes Mediterráneos (Gajardo 1994), entre las coordenadas: 32°27' - 32°19' S, 70°21' - 70°23' O. Al norte limita con la Provincia de Petorca (Región de Valparaíso) y la del Choapa (Región de Coquimbo), al noreste y este, con la Provincia de San Juan (Argentina) y al sureste con la provincia de Los Andes (Región de Valparaíso) (Fig. 1). El área estudiada es parte de dos predios de propiedad de la comunidad Serranía




FIGURA 1. Mapa de la cordillera de Putaendo: (A) sitio de estudio, (B) comuna de Putaendo (Superficie roja) en la Región de Valparaíso. Localidades: (1) Los Patos, (2) Embalse Chacrillas, (3) Junta de los ríos, (4) Las Tejas, (5) Los Ciénagos, (6) Paso Valle Hermoso, (7) Las Launas, (8) Los Puquios, (9) Las Ánimas, (10) Las Trancas. / Map of the Putaendo mountain range: (A) study site, (B) commune of Putaendo (red area) in the Valparaíso Region. Locations: (1) Los Patos, (2) Embalse Chacrillas, (3) Junta de los ríos, (4) Las Tejas, (5) Los Ciénagos, (6) Paso Valle Hermoso, (7) Las Launas, (8) Los Puquios, (9) Las Ánimas, (10) Las Trancas.

La Victoria de Piguchén y Ganadera Tongoy (Tánica S.A.) que en conjunto suman alrededor de 95.400 ha entre los 1100 y los 4.660 m.s.m. (Cerro Longomiche), entre el sector Los Patos y el límite con Argentina respectivamente. Desde las cumbres nacen numerosas cuencas de origen glaciar que forman ríos, esteros, lagunas y bofedales (Fig. 2A-B) (Fernández & Ferrando 2018), el más importante en cuanto a caudal y extensión, es el río Rocín (Fig. 2C) que es tributado por los ríos Tambillos e Hidalgo y los esteros Chilón, Videla, El Zorro, Antuco, La Caldera, y que luego al unirse con el estero Chalaco en el sector Los Patos, dan origen al río Putaendo (Fig. 1).

CLIMA Y VEGETACIÓN

El sitio se caracteriza por ser una zona de transición climática dada por la “diagonal árida” de Sudamérica (Di Castri & Hajek 1976, Villagrán 2018). El norte de esta área está bajo la influencia del Macrobioclima tropical, la que en Chile se extiende desde la frontera con Perú, hasta los 23° S en la costa y 31° S en la cordillera de los Andes, mientras que el sur de los 31° S está, a su vez, bajo la influencia del Macrobioclima mediterráneo, la que se extiende hasta los 37° S, en la costa y los Andes, y hasta los 39° S en la depresión intermedia (Di Castri & Hajek 1976; Moreira-Muñoz 2011; Luebert & Pliscoff 2017).

El área de estudio se encuentra en el ámbito de tres bioclimas: (i) Bioclima de Serranías Interiores (600-2000 m.s.m.), donde la vegetación predominante son los bosques y los matorrales esclerófilos de *Lithrea caustica* (Molina) Hook. & Arn. y *Quillaja saponaria* Molina; (ii) Bioclima Pre-andino (1500-2800 m.s.m.), donde predominan los matorrales bajos de *Chuquiraga oppositifolia* D. Don y marginalmente se desarrollan bosques esclerófilos de *Kageneckia angustifolia* D. Don; y el (iii) Bioclima Andino (>2600 m.s.m.), donde la vegetación está compuesta principalmente por matorrales bajos de *Berberis empetrifolia* Lam. / *Azorella ruizii* G.M. Plunkett & A.N. Nicolas y herbazales de *Pappostipa chrysophylla* (E. Desv.) Romasch. La precipitación media anual promedio varía entre los 300 y 400 mm (Luebert & Pliscoff 2012).

Luebert & Gajardo (2004) realizaron una clasificación general de la vegetación de la cordillera de Putaendo, en la que reconocieron diez unidades de vegetación (ordenadas de menor a mayor elevación): (1) Bosque espinoso abierto de algarrobo (*Neltuma* [=*Prosopis*] *chilensis* (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis) y espino (*Vachellia* [=*Acacia*] *caven* (Molina) Seigler & Ebinger) (1100-1500 m.s.m.), (2) Matorral espinoso

de talhuén (*Trevoa quinquenervia* Gillies & Hook.) y espinillo (*Adesmia confusa* Ulibarri) (1500-2000 m.s.m.), (3) Bosque esclerófilo de quebradas (1100-2200 m.s.m.) (Fig. 2D), (4) Bosque esclerófilo de frangel (*Kageneckia angustifolia*) (1900-2100 m.s.m.) (Fig. 2E), (5) Matorral bajo de yerba blanca (*Chuquiraga oppositifolia*) (2000-2500 m.s.m.), (6) Matorral espinoso de varilla brava (*Adesmia pinifolia* Gillies ex Hook. & Arn.) (2500-2700 m.s.m.), (7) Matorral bajo pulvinado de llaretilla (*Azorella ruizii*) y michay de cordillera (*Berberis empetrifolia*) (2500-3100 m.s.m.), (8) Vegas de juncáceas (incluye bofedales) (> 2600 m.s.m.), (9) Desierto de los acarreos (> 2700 m.s.m.), (10) Matorral-pajonal de llarea (*Azorella madrepórica* Clos) y coirón amargo (*Pappostipa chrysophylla*) (> 3100 m.s.m.).

ESTUDIOS DE LA FLORA EN LOS ANDES DE CHILE MEDITERRÁNEO

Los estudios más completos o exhaustivos se han enfocado en la flora de la cordillera de Santiago (e.g., Meigen 1893; Grandjot & Grandjot 1936; Muñoz-Schick et al. 2000; Teillier et al. 1994; Cavieres et al. 2000; Teillier et al. 2011). También destacan los detallados estudios en la cordillera de Mendoza, Argentina (Böcher et al. 1972; Ambosetti et al. 1986; Méndez et al. 2006; Muñoz et al. 2012). Mientras que, en la cordillera de Valparaíso, los estudios son más escasos, aunque existen algunos reportes de exploraciones históricas (e.g., Del Vitto et al. 1992). La cordillera de Putaendo no fue objeto de estudio por parte de los botánicos de los siglos pasados (Luebert & Gajardo 2004), a pesar de la cercanía con el paso de Uspallata que une las ciudades de Los Andes (Chile) con Mendoza (Argentina), y que fue recorrido por numerosos naturalistas.

En 1991 Zöllner visitó la parte inferior del río Rocín donde recolectó algunas especies cuyas muestras fueron depositadas en el herbario CONC. Más tarde, en el año 2001, Luebert & Gajardo (2004) realizaron la primera expedición botánica para caracterizar la vegetación comprendida entre la cuenca del Chalaco y Rocín hasta el límite con Argentina, en la que registraron 79 especies y reportaron tres nuevos límites de distribución: *Adesmia pinifolia* (norte), *Alstroemeria spathulata* C. Presl (norte) y *Erythranthe depressa* (Phil.) G.L. Nesom (sur). Finalmente, Novoa (2016) realiza un informe de prospección botánica para evaluar el daño a la flora ocasionado por actividades mineras en el sector “Las Tejas”, sumando 29 nuevos registros para el área donde destaca el hallazgo del límite norte de distribución de *Blechnum microphyllum* (Goldm.) C.V. Morton.




FIGURA 2. Unidades de vegetación y paisajes de la cordillera de Putaendo: (A) Bofedal estero El Chilón (~3.600 m.s.m.), (B) laguna altoandina sector Las Launas, vista hacia el Monte Aconcagua (~3500 m.s.m.), (C) Río Rocín, sector Las Tejas (~1900 m.s.m.), (D) Bosque esclerófilo de quebradas (1100-2200 m.s.m), (E) Bosque esclerófilo de *Kageneckia angustifolia*, sector Las Tejas (1900-2100 m.s.m.). / Vegetation units and landscapes of the Putaendo mountain range: (A) Bofedal El Chilón stream (~3600 m.a.s.l.), (B) High Andean lagoon, Las Launas sector, view towards Mount Aconcagua (~3500 m.a.s.l.), (C) Río Rocín, Las Tejas sector (~1900 m.a.s.l.), (D) Sclerophyllous forest of ravines (1100-2200 m.a.s.l.), (E) *Kageneckia angustifolia* sclerophyllous forest, Las Tejas sector (1900-2100 m.a.s.l.).

MÉTODOS

En el marco del proyecto “Flora del Valle de Putaendo”, entre los años 2017 y 2022, entre los meses de octubre y marzo, se llevaron a cabo 15 campañas de campo dirigidas a las tres cuencas principales, la del río Rocín, la del río Hidalgo y la del estero Chalaco y sus afluentes secundarios, cada campaña con una duración de 1 a 7 días. En cada ocasión se recolectó material de herbario que fue depositado en el Herbario del Jardín Botánico Nacional (JBN), además, se fotografiaron la mayoría de los taxones para su posterior determinación utilizando bibliografía taxonómica especializada. Complementariamente, se realizó una revisión exhaustiva del material bibliográfico sobre la flora del sitio de estudio. La nomenclatura taxonómica sigue en general a Rodríguez *et al.* (2018), para *Adiantum* se sigue a Cádiz-Véliz *et al.* (2023), para las Amaryllidaceae de la tribu Hippeastreae, a García *et al.* (2019) y García & Meerow (2020), para las Cactaceae, a Korotkova *et al.* (2021) y Walter & Guerrero (2022), para *Chaetanthera* (Asteraceae), a Davies (2010) y para *Neltuma* (=*Prosopis*, Fabaceae) a Hughes *et al.* (2022). La secuencia sistemática de la lista, la asignación de los órdenes y familias de angiospermas se basan en el APG IV (2016). A cada taxón se le asigna un estatus fitogeográfico (álctono asilvestrado = A, nativo = N y endémico de Chile = E) según Rodríguez *et al.* (2018). Las formas de vida fueron asignadas según la clasificación de Raunkiaer (Braun-Blanquet 1979). Para cada especie se citan los materiales de herbario o estudios que respaldan su presencia en el área, en los casos en que el registro sólo haya sido visual, se menciona como “NR” (No recolectada). Las categorías del estado de conservación de los taxones se obtuvieron de la lista del proceso de clasificación de especies según estado de conservación del Ministerio del Medio Ambiente, Chile (MMA 2022). Mediante la revisión de

bibliografía especializada se identificaron aquellos taxones cuya presencia en el área de estudio constituye un nuevo registro regional o sus poblaciones constituyen un nuevo límite en su distribución geográfica. A cada taxón se le asignó una categoría cualitativa de frecuencia según lo observado en las campañas de terreno: muy frecuente, frecuente, ocasional, escasa, muy escasa. Con el objetivo de conocer la distribución de la riqueza y el grado de endemismo de los taxones por unidad de vegetación, las especies se asignaron a las unidades de vegetación propuestas por Luebert & Gajardo (2004).

RESULTADOS

La riqueza de la flora vascular de la cordillera de Putaendo alcanzó 501 taxa específicos e infraespecíficos distribuidos en 77 familias y en 240 géneros que representan el 26,5 % de la flora de la Región de Valparaíso (Rodríguez *et al.* 2018). El 71 % de las taxa fueron respaldadas por muestras que fueron depositadas en el herbario JBN. Las familias con mayor número de taxa son Asteraceae con ~21 % (n = 106), Fabaceae con 6 % (n = 30), Poaceae con 5 % (n = 26) y Calceolariaceae con ~4 % (n = 19). Los géneros con mayor riqueza son: *Senecio* (n = 18), *Calceolaria* (n = 19), *Adesmia* (n = 13), *Haplopappus* (n = 11) y *Chaetanthera* (n = 10) (Ver lista detallada en el Apéndice 1). Nueve géneros son endémicos de Chile: *Calopappus*, *Moscharia*, *Spinoliva* (Asteraceae), *Homalocarpus* (Apiaceae), *Lastarriaea* (Polygonaceae), *Leucocoryne*, *Phycella* (Amaryllidaceae), *Scyphanthus* (Loasaceae) y *Trevoa* (Rhamnaceae) (Fig. 3 y Fig. 4B). De acuerdo con el estatus fitogeográfico de los taxones, 318 (63,5 %) son nativas, 161 (32,1 %) son endémicas de Chile y 22 (4,4 %) son álctonas asilvestradas. Si se consideran solo las autóctonas, el endemismo asciende a 33,6 %.

TABLA 1. Formas de vida según Raunkiaer, ordenadas de mayor a menor representatividad. / Life forms according to Raunkiaer, in order of highest to lowest representativeness.

Formas de vida	Nº de taxa	%
Hemicriptófitas	225	44,9
Caméfitas	95	19,0
Terófitas	87	17,4
Nanofanerófitas	32	6,4
Geófitas	29	5,8
Fanerófitas	18	3,6
Hidrófitas	15	3,0
TOTAL	501	100




FIGURA 3. Algunos géneros endémicos de Chile presentes en la cordillera de Putaendo: (A) *Calopappus acerosus*, (B) *Homalocarpus dichotomus*, (C) *Lastarriaea chilensis*, (D) *Leucocoryne violaceascens*, (E) *Moscharia pinnatifida*, (F) *Scyphanthus elegans*, (G) *Spinoliva ilicifolia* subsp. *baccharoides*. Fotografías: (A, B, D, E, F) A. Cádiz-Véliz, (C) A. Moreira-Muñoz. / Some Chilean endemic genera present in the Putaendo mountain range: (A) *Calopappus acerosus*, (B) *Homalocarpus dichotomus*, (C) *Lastarriaea chilensis*, (D) *Leucocoryne violaceascens*, (E) *Moscharia pinnatifida*, (F) *Scyphanthus elegans*, (G) *Spinoliva ilicifolia* subsp. *baccharoides*. Photographs: (A, B, D, E, F) Arón Cádiz-Véliz, (C) Andrés Moreira-Muñoz.




FIGURA 4. Especies en la categoría Vulnerable (VU) a la extinción presentes en la cordillera de Putaendo. (A) *Alstroemeria parvula*, (B) *Phycella ornata*, (C1) *Senecio davilae*, (C2) detalle de los capítulos, (D) *Eriosoce aurata*, (E) *Neltuma chilensis*, (F) *Porlieria chilensis*. Fotografías: (A-F) A. Cádiz-Véliz. / Species in the Vulnerable (VU) to extinction category present in the Putaendo mountain range. (A) *Alstroemeria parvula*, (B) *Phycella ornata*, (C1) *Senecio davilae*, (C2) detail of the capitulum, (D) *Eriosoce aurata*, (E) *Neltuma chilensis*, (F) *Porlieria chilensis*. Photographs: (A-F) Arón Cádiz-Véliz.

En orden de representación de las formas de vida, las hemicriptófitas (44,7 %) fueron las más representadas, le siguen las caméfitas (18,2 %), terófitas (17,2 %), nanofanerófitas (6,4 %), geófitas (5,8 %), fanerófitas (3,6 %), hidrófitas (3 %). Se registraron, además, un 1,2 % de plantas parásitas, las que se pueden clasificar en terófitas, como *Cuscuta* sp., hemicriptófitas como *Quinchamalium chilense* Molina y caméfitas como *Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh., *T. corymbosus* (L.) Kuijt, *T. verticillatus* (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens y *Tristerix aphyllus* (DC.) Barlow & Wiens.

Se registraron 25 especies clasificadas en alguna categoría de conservación (Tabla 2), entre las que destacan ocho consideradas vulnerable a la extinción (VU): *Adesmia pinifolia* Gillies ex Hook. & Arn., *Alstroemeria parvula* Phil.,

Eriosyce aurata (Pfeiff.) Backeb., *Neltuma chilensis*, *Phycella ornata* (Miers) Nic. García, *Porlieria chilensis* I.M. Johnst., *Senecio davilae* Phil., *Senecio jungei* Phil. (4, 6). Otras seis se encuentran en la categoría de casi amenazada (NT) y once en la categoría preocupación menor (LC). La mayoría de estas especies se concentran entre los 1100 y 2500 m.s.m.

Se encontraron 45 especies que constituyen nuevos registros para la Región de Valparaíso que no figuran catálogo de Rodríguez et al. (2018) (Tabla 3). Adicionalmente, se registraron 34 nuevos límites de distribución de especies que se suman a los cuatro reportados anteriormente por Luebert & Gajardo (2004) y Novoa (2016), alcanzando un total de 38 especies que tienen su límite en el área de estudio. De acuerdo con los nuevos antecedentes, 26 especies alcanzan su límite norte y 12, el sur (Tabla 4).

TABLA 2. Especies en categoría de conservación de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de especies del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). CC = Categoría de Conservación, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada, LC = Preocupación Menor. / Species in conservation category according to the Regulation of Classification of species of the Ministry of Environment (MMA). CC = Conservation Category, VU = Vulnerable, NT = Near Threatened, LC = Least Concern.

Nº	Familia	Especie	CC	Decreto
1	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria parvula</i>	VU	En Proceso 18/2022 MMA
2	Amaryllidaceae	<i>Phycella ornata</i>	VU	DS 19/2012 MMA
3	Asteraceae	<i>Senecio davilae</i>	VU	En Proceso 18/2022 MMA
4	Asteraceae	<i>Senecio jungei</i>	VU	En Proceso 19/2022-2023 MMA
5	Cactaceae	<i>Eriosyce aurata</i>	VU	DS 13/2013 MMA
6	Fabaceae	<i>Adesmia pinifolia</i>	VU	En Proceso 19/2022-2023 MMA
7	Fabaceae	<i>Neltuma chilensis</i>	VU	DS 13/2013 MMA
8	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i>	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
9	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria spathulata</i>	NT	DS 44/2021 MMA
10	Cactaceae	<i>Leucostele chiloensis</i>	NT	DS 41/2011 MMA
11	Cactaceae	<i>Maihueniopsis glomerata</i>	NT	DS 13/2013 MMA
12	Cactaceae	<i>Maihueniopsis ovata</i>	NT	DS 19/2012 MMA
13	Pteridaceae	<i>Pellaea myrtillifolia</i>	NT	DS 13/2013 MMA
14	Rosaceae	<i>Kageneckia angustifolia</i>	NT	DS 44/2021 MMA
15	Apiaceae	<i>Azorella ruizii</i>	LC	DS 42/2011 MMA
16	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	LC	DS 19/2012 MMA
17	Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i>	LC	DS 41/2011 MMA
18	Cystopteridaceae	<i>Cystopteris apiiformis</i>	LC	DS 19/2012 MMA
19	Phrymaceae	<i>Erythranthe depressa</i>	LC	DS 44/2021 MMA
20	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i>	LC	DS 19/2012 MMA
21	Pteridaceae	<i>Adiantum excisum</i>	LC	DS 38/2015 MMA
22	Pteridaceae	<i>Adiantum scabrum</i>	LC	DS 38/2015 MMA
23	Pteridaceae	<i>Cheilanthes glauca</i>	LC	DS 38/2015 MMA
24	Pteridaceae	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	LC	DS 38/2015 MMA
25	Pteridaceae	<i>Cheilanthes mollis</i>	LC	DS 38/2015 MMA

TABLA 3. Nuevos registros para la Región de Valparaíso y nuevos límites de distribución. Los nuevos registros regionales se indican con una "X". Acrónimo de las Regiones de Chile: Arica y Parinacota = AYP, Tarapacá = TAR, Antofagasta = ANT, Atacama = ATA, Coquimbo = COQ, Valparaíso = VAL, Metropolitana de Santiago = RME, Libertador Bernardo O'Higgins = LBO, Maule = MAU, Ñuble = NUB, Biobío = BIO, Araucanía = ARA, Los Ríos = LRI, Los Lagos = LLA, Magallanes = MAG. / New records for the Valparaíso Region and new distribution limits. Acronyms for Chilean Regions: Arica y Parinacota = AYP, Tarapacá = TAR, Antofagasta = ANT, Atacama = ATA, Coquimbo = COQ, Valparaíso = VAL, Metropolitana de Santiago = RME, Libertador Bernardo O'Higgins = LBO, Maule = MAU, Ñuble = NUB, Biobío = BIO, Araucanía = ARA, Los Ríos = LRI, Los Lagos = LLA, Magallanes = MAG.

Familia	Especie	Distribución en Chile
Apiaceae	<i>Asteriscium aemocarpon</i>	COQ a LBO
Apiaceae	<i>Azorella cryptantha</i>	ATA a VAL
Apiaceae	<i>Azorella trifoliolata</i>	ANT a MAG
Apiaceae	<i>Hydrocotyle verticillata</i>	VAL a BIO
Apocynaceae	<i>Diplolepis nummulariifolia</i>	COQ a LRI
Asteraceae	<i>Hypochaeris acaulis</i>	COQ a ARA
Asteraceae	<i>Nassauvia revoluta</i>	VAL a MAG
Asteraceae	<i>Senecio jungei</i>	COQ a VAL
Asteraceae	<i>Senecio pissisi</i>	ATA a VAL
Blechnaceae	<i>Blechnum microphyllum</i>	VAL a LLA
Boraginaceae	<i>Cryptantha involucrata</i>	ATA a RME
Boraginaceae	<i>Phacelia pinnatifida</i>	AYP a VAL
Brassicaceae	<i>Draba pusilla</i>	COQ a MAG
Brassicaceae	<i>Menonvillea scapigera</i> subsp. <i>longipes</i>	ATA a NUB
Cactaceae	<i>Leucostele chiloensis</i> subsp. <i>eburneus</i>	COQ a VAL
Cactaceae	<i>Maihueniopsis glomerata</i>	ANT a VAL
Calceolariaceae	<i>Calceolaria flavovirens</i>	ATA a VAL
Calyceraceae	<i>Calycera eryngioides</i>	COQ a LBO
Calyceraceae	<i>Moschopsis leyboldii</i>	VAL a RME
Caryophyllaceae	<i>Spergula pissisi</i>	ATA a VAL
Cyperaceae	<i>Carex malmei</i>	ATA a RME
Cyperaceae	<i>Phylloscirpus acaulis</i>	AYP a ARA
Cyperaceae	<i>Zameioscirpus gaimardioides</i>	ATA a LBO
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia germainii</i>	COQ a RME
Fabaceae	<i>Adesmia echinus</i>	ANT a MAU
Fabaceae	<i>Adesmia gracilis</i>	COQ a MAU
Fabaceae	<i>Adesmia hemisphaerica</i>	TAR a RME
Fabaceae	<i>Adesmia pinifolia</i>	VAL a RME
Fabaceae	<i>Anarthrophyllum gayanum</i>	COQ a RME
Fabaceae	<i>Trifolium vestitum</i>	COQ a RME
Gentianaceae	<i>Gentianella multicaulis</i>	ATA a VAL
Isoetaceae	<i>Isoetes</i> sp.	VAL
Onagraceae	<i>Epilobium denticulatum</i>	AYP a BIO
Onagraceae	<i>Gayophytum humile</i>	ATA a MAU
Poaceae	<i>Bromus setifolius</i> var. <i>pictus</i>	VAL a MAG
Poaceae	<i>Festuca kurtziana</i>	COQ a MAU

Familia	Especie	Distribución en Chile
Poaceae	<i>Festuca panda</i>	AYP, COQ, VAL
Poaceae	<i>Trisetum johnstonii</i> subsp. <i>johnstonii</i>	ATA a RME
Polygonaceae	<i>Rumex magellanicus</i>	COQ a MAG
Ranunculaceae	<i>Myosurus apetalus</i>	COQ a MAG
Rosaceae	<i>Acaena leptacantha</i>	VAL a LLA
Rosaceae	<i>Acaena splendens</i>	COQ a BIO
Verbenaceae	<i>Junellia origenes</i>	ANT a VAL
Verbenaceae	<i>Junellia spathulata</i> var. <i>spathulata</i>	COQ a MAU
Verbenaceae	<i>Junellia trifurcata</i>	VAL a RME

TABLA 4. Nuevos límites de distribución. Acrónimo de las Regiones de Chile: Arica y Parinacota = AYP, Tarapacá = TAR, Antofagasta = ANT, Atacama = ATA, Coquimbo = COQ, Valparaíso = VAL, Metropolitana de Santiago = RME, Libertador Bernardo O'Higgins = LBO, Maule = MAU, Ñuble = NUB, Biobío = BIO, Araucanía = ARA, Los Lagos = LLA, Aisén = AIS, Magallanes = MAG. / New distribution limits. Acronyms for Chilean Regions: Arica y Parinacota = AYP, Tarapacá = TAR, Antofagasta = ANT, Atacama = ATA, Coquimbo = COQ, Valparaíso = VAL, Metropolitana de Santiago = RME, Libertador Bernardo O'Higgins = LBO, Maule = MAU, Ñuble = NUB, Biobío = BIO, Araucanía = ARA, Los Lagos = LLA, Aisén = AIS, Magallanes = MAG.

Familia	Especie	Límite de distribución	Distribución en Chile
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria parvula</i>	Norte	VAL a RME
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria spathulata</i>	Norte	VAL a LBO
Amaryllidaceae	<i>Phycella ornata</i>	Norte	VAL a RME
Anacardiaceae	<i>Schinus caeselii</i>	Norte	VAL a MAU
Apiaceae	<i>Azorella cryptantha</i>	Sur	ATA a VAL
Apiaceae	<i>Hydrocotyle verticillata</i>	Norte	VAL a BIO
Asteraceae	<i>Chaetanthera flabellata</i>	Norte	VAL a MAU
Asteraceae	<i>Haplopappus anthylloides</i>	Norte	VAL a MAU
Asteraceae	<i>Haplopappus ochagavianus</i>	Norte	VAL a RME
Asteraceae	<i>Leucheria hieracioides</i>	Norte	VAL a MAU
Asteraceae	<i>Leucheria rosea</i>	Norte	VAL a MAU
Asteraceae	<i>Nassauvia revoluta</i>	Norte	VAL a MAG
Asteraceae	<i>Senecio davilae</i>	Norte	VAL a RME
Asteraceae	<i>Senecio jungei</i>	Sur	COQ a VAL
Asteraceae	<i>Senecio laetevirens</i>	Norte	VAL a RME
Asteraceae	<i>Senecio pissisi</i>	Sur	ATA a VAL
Berberidaceae	<i>Berberis montana</i>	Norte	VAL a AIS
Blechnaceae	<i>Blechnum microphyllum</i>	Norte	VAL a LLA
Boraginaceae	<i>Phacelia pinnatifida</i>	Sur	AYP a VAL
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> var. <i>aconquensis</i>	Norte	VAL
Cactaceae	<i>Leucostele chiloensis</i> subsp. <i>eburneus</i>	Sur	COQ a VAL
Cactaceae	<i>Maihueniopsis glomerata</i>	Sur	ANT a VAL
Calceolariaceae	<i>Calceolaria flavovirens</i>	Sur	ATA a VAL
Calyceraceae	<i>Moschopsis leyboldii</i>	Norte	VAL a RME

Familia	Especie	Límite de distribución	Distribución en Chile
Caryophyllaceae	<i>Spergula pissisi</i>	Sur	ATA a VAL
Fabaceae	<i>Lathyrus subandinus</i>	Norte	VAL a ARA
Fabaceae	<i>Vicia nigricans</i>	Norte	VAL a AIS
Gentianaceae	<i>Gentianella multicaulis</i>	Sur	ATA a VAL
Orchidaceae	<i>Chloraea alaris</i>	Norte	VAL a ARA
Orchidaceae	<i>Chloraea picta</i>	Norte	COQ a LBO
Phrymaceae	<i>Erythranthe depressa</i> var. <i>depressa</i>	Sur	ANT a VAL
Poaceae	<i>Bromus setifolius</i> var. <i>pictus</i>	Norte	VAL a MAG
Poaceae	<i>Festuca panda</i>	Sur	AYP, COQ, VAL
Rosaceae	<i>Acaena leptacantha</i>	Norte	VAL a LLA
Verbenaceae	<i>Junellia origenes</i>	Sur	ANT a VAL
Verbenaceae	<i>Junellia trifurcata</i>	Norte	VAL a RME
Violaceae	<i>Viola philippii</i>	Norte	VAL a MAU
Violaceae	<i>Viola subandina</i>	Norte	VAL a NUB

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y ENDEMISMO POR UNIDAD DE VEGETACIÓN

Se encontró que las unidades de vegetación ubicadas entre los 1100-2500 m.s.m., desde el “Bosque espinoso de algarrobo y espino” hasta el “Matorral bajo de yerba blanca” (Fig. 5), mostraron la mayor riqueza de taxones y el mayor grado de endemismo. A medida que se aumenta en altitud, la riqueza y endemismo disminuye progresivamente. Las unidades de vegetación asociadas a suelos anegados o con alta humedad como el “bosque esclerófilo de quebradas” y las “vegas de juncáceas” muestran una baja riqueza y un bajo grado de endemismo, al igual que las unidades de vegetación que sobrepasan los 2500 m.s.m.

ALGUNOS HALLAZGOS DESTACADOS

Destaca la presencia de ocho especies microendémicas que presentan una distribución restringida (Vanderplank *et al.* 2014; Caesar *et al.* 2017), en no más de dos regiones administrativas contiguas de Chile, es decir; regiones de Valparaíso-Coquimbo o Valparaíso-Metropolitana (1-8), además de especies que son escasas en la cordillera de Putaendo (A-H).

(1) *Alstroemeria parvula* Phil.: se distribuye entre el norte de la Región Metropolitana (Madrid 2019) y el área de estudio de este trabajo, donde alcanza su límite norte en el sector Las Tejas. Entre los 2200 y los 2600 m.s.m. se registraron menos de 50 ejemplares (Fig. 4A), la mayoría de ellos con signos de herbivoría y amenazadas por actividades mineras.

(2) *Calceolaria glandulosa* Poepp. ex Benth. subsp. *alicalahuensis*

(Muñoz-Schick) C. Ehrh.: su distribución va desde el límite entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso, provincia de Petorca, hasta el valle de Putaendo (Ehrhart 2000). Se registró una pequeña población sobre suelo arenoso en el sector Junta de Los Ríos (1510 m.s.m.).

(3) *Eriosyce curvispina* var. *aconcaguensis* (F.Ritter) Katt.: esta variedad fue descrita como *Pyrrhocactus aconcaguensis* F. Ritter (Korotkova *et al.* 2021) y en la actualidad se encuentra bajo la sinonimia de *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. (Rodríguez *et al.* 2018). De acuerdo con estudios moleculares, esta variedad debe ser rehabilitada como especie (Pablo Guerrero, com. pers.). Su distribución se restringe al valle de Aconcagua, entre la cuesta de Las Chilcas (Llay-Llay) y el valle del río Rocín, en el sector Las Tejas, ~2000 m.s.m., donde alcanza su nuevo límite norte de distribución (Fig. 6F). Su estado de conservación no ha sido evaluado por el MMA, sin embargo, Hoffmann & Walter (2004) sugieren que se trata de un cactus vulnerable a la extinción; gran parte de sus poblaciones se han perdido debido a la expansión de los cultivos en laderas (obs. pers.) o por la apertura de caminos mineros (Novoa 2016). Se distingue principalmente por presentar flores de color amarillo limón y los segmentos del perianto de ~10 mm de ancho (Kattermann 1994).

(4) *Junellia trifurcata* (Phil.) Moldenke: se consideraba un endemismo de los Andes de la Región Metropolitana (Peralta *et al.* 2008; Rodríguez *et al.* 2018), sin embargo, durante este estudio se registró una pequeña población en una ladera rocosa de la cuenca del río Hidalgo (3250 m.s.m.).

Este hallazgo constituye el nuevo límite norte de distribución y un nuevo registro para la región.

(5) *Leucostele chiloensis* subsp. *eburneus* (Phil. ex K.Schum.) Schlumpb.: se ha registrado históricamente en la precordillera de la provincia del Choapa (Región de Coquimbo) bajo los 900 m.s.m. (Albesiano 2012), sin embargo, Novoa (2016) menciona la presencia de este taxón en el sector Las Tejas, adicionalmente, durante el presente estudio se registraron poblaciones en las cuencas del Chalaco e Hidalgo, entre los 1000-1900 m.s.m. Estos registros constituyen el nuevo límite sur y altitudinal de esta cactácea y nuevo registro para la Región de Valparaíso.

(6) *Phycella ornata* (Miers) Nic.García: se distribuye entre el límite norte de la Región Metropolitana (provincia de Chacabuco) y el santuario de la naturaleza Serranía del Ciprés por el norte (Madrid et al. 2018). Se registraron poblaciones con pocos ejemplares en la cuenca del estero Chalaco (2200 m.s.m.) y del río Rocín, sector Las Tejas (1900 m.s.m.), en

sitios aledaños a caminos de exploración minera (Fig. 4B). Estos registros aumentan su límite de distribución en 47 km lineales hacia el norte.

(7) *Senecio jungei* Phil.: se ha considerado como endémica de la provincia de Choapa (Cabrera 1949), sin embargo, se encontró una población con pocos ejemplares en el camino del embalse Chacrillas (1300 m.s.m.) (Fig. 6A), por lo que este registro constituye su nuevo límite sur y un nuevo registro regional. Esta población se encuentra amenazada por ensanchamiento de caminos y probablemente, su área original fue afectada por la construcción y posterior inundación del embalse.

(8) *Senecio davilae* Phil: estaba registrado entre el sur de la Región Metropolitana, en el Parque Nacional Río Clarillo, y el santuario de la naturaleza Serranía El Ciprés, en la Región de Valparaíso (Madrid et al. 2018), sin embargo, se registró una población en el sector Las Tejas (2200 m.s.m.) (Fig. 4C), a 47 km lineales al noreste del anterior límite norte.




FIGURA 5. Riqueza de taxa por unidad de vegetación (A) y porcentaje de endemismo por unidad de vegetación (B). Unidades de vegetación: (1) Bosque espinoso de algarrobo y espino (1100-1500 m.s.m.), (2) Matorral espinoso talhuén y espinillo (1500-2000 m.s.m.), (3) Bosque esclerófilo de quebradas (1100-2200 m.s.m.), (4) Bosque esclerófilo de frangel (1900-2100 m.s.m.), (5) Matorral bajo de chuquiraga (2000-2500 m.s.m.), (6) Matorral espinoso de yerba blanca (2500- 2700 m.s.m.), (7) Matorral bajo pulvinado de llaretilla y michay de cordillera (2500-3100 m.s.m.), (8) Vegas de juncáceas (> 2600 m.s.m.), (9) Desierto de los acarreos (> 2700 m.s.m.), (10) Matorral-pajonal de llareta y coirón amargo (> 3100 m.s.m.). / Taxa richness per vegetation unit (A) and percentage of endemism per vegetation unit (B). Vegetation units: (1) Bosque espinoso de algarrobo y espino (1100-1500 m.s.m.), (2) Matorral espinoso talhuén y espinillo (1500-2000 m.s.m.), (3) Bosque esclerófilo de quebradas (1100-2200 m.s.m.), (4) Bosque esclerófilo de frangel (1900-2100 m.s.m.), (5) Matorral bajo de chuquiraga (2000-2500 m.s.m.), (6) Matorral espinoso de yerba blanca (2500- 2700 m.s.m.), (7) Matorral bajo pulvinado de llaretilla y michay de cordillera (2500-3100 m.s.m.), (8) Vegas de juncáceas (> 2600 m.s.m.), (9) Desierto de los acarreos (> 2700 m.s.m.), (10) Matorral-pajonal de llareta y coirón amargo (> 3100 m.s.m.).

(A) *Blechnum microphyllum* (Goldm.) C.V. Morton: reportada por Novoa (2016) en el sector Las Tejas (Fig. 6B), e indica que el anterior límite norte se ubicaba a 153 km lineales hacia el sur (Región Metropolitana). Madrid *et al.* (2018), la registraron en el S.N. Serranía del Ciprés, a ~47 km lineales al suroeste, con una población con escasos individuos a los 2000 m.s.m. (Andrés Madrid, com. pers.). Estas poblaciones en el extremo norte de su distribución tienen carácter relictual dado que su presencia en esta área no se explica por las condiciones ambientales actuales, sino que, la ocupación debió realizarse bajo condiciones climáticas diferentes dadas en un pasado más o menos remoto (Sarmiento *et al.* 2000). Además, presenta características típicas de flora relictual tales como: reducido número de individuos, distribución fragmentada y alejada del área de distribución principal (Habel & Assmann 2010; Pérez-Latorre *et al.* 2018). La flora relictual está especialmente amenazada por sus condiciones intrínsecas que las hacen sensibles a las alteraciones del hábitat y al cambio climático (Garfi & Buord 2012; Pérez-Latorre *et al.* 2018). Particularmente, la única población registrada en el área de estudio se encuentra amenazada por la actividad minera debido a deslizamientos de tierra, apertura de caminos, polvo en suspensión, entre otras.

(B) *Chloraea alaris* Lindl.: según Rodríguez *et al.* (2018) corresponde a un sinónimo de *Chloraea galeata* Lindl., sin embargo, Novoa *et al.* (2015) la consideran especie válida, ya que se diferencia de *C. galeata*, principalmente, porque sus flores son de la mitad del tamaño de *C. galeata*, lo que se pudo corroborar en terreno. Se encontró una población con menos de 5 individuos a los 1800 m.s.m. (Fig. 6C), entre las unidades de vegetación “Matorral espinoso talhuén y espinillo” y el “Bosque esclerófilo de frangel”, al costado del camino de acceso al proyecto minero Vizcachitas (Río Rocín).

(C) *Eriosyce aurata* (Pfeiff.) Backeb. var. *aurata*: esta variedad se distribuye entre la Región de Atacama y Metropolitana (Rodríguez *et al.* 2018), y sus poblaciones se han visto reducidas debido a la extracción de individuos de hábitat para su comercialización como planta ornamental (Señoret & Acosta 2013). En el área de estudio de este trabajo se encontró una población importante de esta cactácea entre los 1100 y 2000 m.s.m., con algunos individuos de gran tamaño que superaban el metro de alto y los 80 cm de diámetro (Fig. 4D). Sus poblaciones están amenazadas por la apertura de caminos, actividades mineras y extracción para uso ornamental.

(D) *Festuca panda* Swallen: Ospina *et al.* (2015) realizaron la revisión del género *Festuca* en Chile y citan la especie para los Andes de la Provincia del Limarí (Región de Coquimbo),

posteriormente Rodríguez *et al.* (2018) la mencionan para la Región de Atacama y Coquimbo, entre los 2900-3400 m.s.m. En este estudio, encontramos esta especie en áreas aledañas al bofedal de la cabecera del río Hidalgo (3640 m.s.m.). Este registro corresponde al nuevo límite sur de distribución y una adición a la flora de la Región de Valparaíso. Cabe destacar que esta especie ha sido escasamente colectada, por ejemplo, Ospina *et al.* (2015) citan sólo una muestra depositada en el herbario CONC y hay solo un ejemplar en la colección del herbario SGO (Mélica Muñoz-Schick, com. pers.).

(E) *Isoetes* sp.: Se encontró sumergida en las lagunas altoandinas (3500 m.s.m.) del sector Las Launas. De acuerdo con su morfología, es similar a *Isoetes chubutiana* Hickey, Macluf & W.C. Taylor, sin embargo, *I. chubutiana* presenta licófilos con el ápice acuminado (Macluf 2016), mientras que los ejemplares encontrados tienen el ápice obtuso. Es necesario colectar material con estructuras reproductivas y realizar análisis genéticos para determinar su identidad.

(F) *Maihueniopsis glomerata* (Haw.) R. Kiesling: el último tratamiento del género en Chile concluye en que *M. glomerata* no se ha documentado en dicho país (Walter & Guerrero 2022). Sin embargo, se registró una población de *Maihueniopsis* sin flores ni frutos, pese a esto, la morfología del cuerpo vegetativo, el hábitat y distribución coincide con *M. glomerata* que se ha registrado en las provincias vecinas de San Juan y Mendoza (Kiesling 1984), por lo que se atribuyó su identidad a dicha especie. La población registrada estaba formada por no más de 10 cojines de entre 50-100 cm de diámetro en el sector Los Ciénagos, cuenca del río Rocín, a los 2860 m.s.m. (Fig. 6D).

(G) *Rumex magellanicus* Campd.: presenta una distribución disyunta, con registros en la Región de Coquimbo, Aysén y Magallanes (Rodríguez *et al.* 2018). En el presente estudio se reporta por primera vez para la Región de Valparaíso, con una población de menos de 50 individuos creciendo a orillas del estero El Tábano a los 3100 m.s.m. (Fig. 6E).

(H) *Tropaeolum looseri* Sparre: Rodríguez *et al.* (2018) consideran esta especie como endémica de la Región de Coquimbo, sin embargo, Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz (2013) indican que se distribuye entre el Valle de Huasco (Región de Atacama) y el de Aconcagua (Región de Valparaíso) formando pequeñas poblaciones. En el área de estudio, se encontró una población con menos de 10 individuos creciendo sobre *Proustia cuneifolia* D. Don subsp. *cuneifolia* en la parte baja de la cuenca del Estero El Chalaco a los 1200 m.s.m.




FIGURA 6. Algunos hallazgos destacados: (A) *Senecio jungei*, (B) *Blechnum microphyllum*, (C) *Chloraea alaris*, (D) *Maihueniopsis glomerata*, (E) *Rumex magellanicus*, (F) *Eriosyce curvispina* var. *aconcaguensis*. Fotografías: (A, D, E, F) A. Cádiz-Véliz, (B) P. Novoa, (C) Sergio Elórtegui. / Some outstanding findings: (A) *Senecio jungei*, (B) *Blechnum microphyllum*, (C) *Chloraea alaris*, (D) *Maihueniopsis glomerata*, (E) *Rumex magellanicus*, (F) *Eriosyce curvispina* var. *aconcaguensis*. Photographs: (A, D, E, F) A. Cádiz-Véliz, (B) P. Novoa, (C) Sergio Elórtegui.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Este estudio es el primero en reportar la flora vascular de la cordillera de Putaendo. De acuerdo con Rodríguez *et al.* (2018) la flora vascular de la región está representada por al menos 1891 taxones, de los que 790 (41,8 %) son nativos, 704 (37,2 %) son endémicos de Chile y 397 (21 %) son alóctonos asilvestrados, por lo que la riqueza reportada en este estudio representa un 26,5 % de la flora regional. Cabe destacar que estudios similares en la cordillera del Maipo (Región Metropolitana) revelan una riqueza cercana a 350 especies con 29 % de endemismo (Muñoz-Schick *et al.* 2000). El porcentaje de alóctonas asilvestradas en la cordillera de Putaendo es bajo (4,4 %), menor que el nivel nacional (14,9 %), lo que da cuenta del buen estado de conservación de esta área, mientras que los valles inferiores a los 1000 m.s.m., se encuentran profundamente modificados por la agricultura y urbanización (Madrid *et al.* 2018).

La riqueza y grado de endemismo del sitio de estudio puede ser explicado, en cierta medida, por la amplia heterogeneidad ambiental que varía abruptamente con las características edáficas, exposición y altitud (Novoa 2016), por el buen estado de conservación y porque la cordillera de Putaendo está inserta en una zona de transición climática donde ocurre el encuentro de taxones que están típicamente distribuidas hacia el norte o sur de esta área, esto queda de manifiesto con el número de especies que alcanzan su límite de distribución en esta área. Esto último es importante, puesto que se ha demostrado que las poblaciones ubicadas en los márgenes de la distribución de especies tienen gran relevancia para la conservación a largo plazo de la diversidad genética e historia filogenética, debido a que son sitios donde suelen ocurrir eventos de especiación por efecto del aislamiento por distancia, por lo que su conservación y estudio son de alta prioridad (Hampe & Petit 2005; Maciel-Mata *et al.* 2015).

La presencia de varios géneros endémicos en la cordillera de Putaendo se atribuye a la evolución independiente de la flora de Chile Central del resto del continente producto del antiguo y prolongado aislamiento geográfico generado, principalmente, por el levantamiento de la cordillera de los Andes y la formación el desierto de Atacama a fines del Mioceno (Hartley & Chong 2002; Moreira-Muñoz *et al.* 2020). Es importante considerar la conservación de estos géneros, ya que en su mayoría son monotípicos o presentan una baja riqueza específica, y se ha señalado que la probabilidad de extinción aumenta en taxones con pocas especies, por lo tanto, si una o las pocas especies del taxón desaparecen, se extinguiría la historia evolutiva del grupo completo (Vamosi & Wilson 2008; Urbina-Casanova *et al.* 2015).

En cuanto a la distribución de la riqueza y endemismo, el patrón registrado es similar a lo encontrado en la cuenca superior del río Aconcagua y del Maipo, donde disminuyen con el aumento de la altitud (ver Quintanilla 1978; Cavieres *et al.* 2000; Muñoz-Schick *et al.* 2000; Madrid *et al.* 2018).

En relación con la riqueza de especies, dicha reducción se atribuye al incremento en la intensidad de las condiciones estresantes para la supervivencia y la reproducción de las plantas como: la gran amplitud térmica diaria y estacional, la baja temperatura del aire y del suelo, la brevedad de la estación de crecimiento, la reducción de la profundidad y de la calidad del suelo, el aumento de las pendientes y de la velocidad del viento (Muñoz-Schick *et al.* 2000; Cavieres *et al.* 2021). Mientras que, el alto grado de endemismo de las unidades de vegetación ubicadas entre los 1100 y 2500 m.s.m. (Fig. 5), de entre 47 y 30 %, se atribuye al aislamiento biogeográfico en el que ha evolucionado la flora mediterránea de Chile central (Moreira-Muñoz 2011). Sobre los 2500 m.s.m. el endemismo se reduce, llegando a un 4 % en la unidad de vegetación ubicada sobre los 3100 m.s.m.; esto debido a que la mayoría de los taxones se distribuyen en ambas vertientes de los Andes (Muñoz-Schick *et al.* 2000).

El bosque esclerófilo de quebradas y las vegas de juncáceas muestran una baja riqueza y endemismo, esto se explica, porque estas unidades ocupan un área reducida respecto de las unidades de vegetación que se encuentran dentro del mismo rango de elevación y porque la flora hidrófila generalmente es de amplia distribución (Ramírez & San Martín 2006).

Las especies alóctonas asilvestradas se concentran en las unidades de vegetación que se encuentran bajo los 2500 m.s.m., ya que esta área es la que históricamente ha recibido mayor intervención humana por efecto de la ganadería, de la apertura de caminos y actualmente, por la actividad minera, que facilitan el ingreso de plantas invasoras (Fuentes *et al.* 2010; Madrid *et al.* 2018).

Es importante destacar la presencia de bofedales donde dominan *Oxychloe bisexualis* Kuntze y *Patosia clandestina* (Phil.) Buchenau. Estas formaciones cumplen un rol crítico en el mantenimiento de la biota andina y la regulación hídrica, son ecosistemas extremadamente frágiles por su dependencia del agua, sensibles a los cambios climáticos y vulnerables a la alteración humana (Squeo *et al.* 2006). En la cordillera de Putaendo se desarrollan principalmente en las cabeceras de las cuencas, sobre los 3000 m.s.m., y se mantienen gracias a la contribución hídrica de los glaciares rocosos (Fernández & Ferrando 2018).

El árbol endémico *Kageneckia angustifolia* ocupa una franja entre los 1500 y los 2200 m.s.m. (Luebert & Pliscoff 2017; Peñaloza *et al.* 2001), sin embargo, se observó que los

ejemplares que crecían bajo los 1800 m.s.m., presentaban signos de estrés hídrico severo o estaban muertos; es posible que lo observado se explique por el aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones (Luebert & Pliscoff 2012).

Uno de los problemas reconocidos desde hace décadas, es la escasa representatividad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) en todo Chile mediterráneo (Pliscoff & Fuentes-Castillo 2011), particularmente, la Región de Valparaíso tiene menos del 5 % de su superficie protegida, incluyendo áreas silvestres protegidas del Estado, Santuarios de la Naturaleza e iniciativas privadas de conservación (Madrid et al. 2018). En la cordillera andina de Valparaíso hay 3 áreas protegidas, Reserva Nacional Río Blanco (10.175 ha), Santuario de la Naturaleza El Zaino y laguna El Copín (6.741 ha) y sitio Ramsar Parque Andino Juncal (13.796 ha) las cuales representan sólo el ~1.9 % de la superficie continental de la Región de Valparaíso, por lo que la actual protección de los ecosistemas andinos es insuficiente. Cabe destacar que el bosque espinoso de *Neltuma chilensis* y *Vachellia caven* se ha reducido en más de 66 %, manteniendo una superficie remanente de 1.156 km² y con el 0,1 % de superficie protegida (Luebert & Pliscoff 2017), mientras que, el bosque esclerófilo de *Kageneckia angustifolia* mantiene una superficie total remanente de 4.546 km², de las cuales posee solo 7,7 % se superficie protegida. Por otra parte, a nivel mundial, las áreas de humedales se han reducido en más de 85 % en un periodo de 300 años (Bradshaw et al. 2021), por lo que la conservación de los humedales andinos (bofedales) y subandinos (vegas, vegetación riparia y bosque esclerófilo de quebradas) es prioritaria. La cordillera de Putaendo alberga recursos escasos y representativos de Chile central que se manifiestan como especies amenazadas y relictas, alto grado de endemismo, plantas con distribución restringida (microendemismos) y numerosos límites de distribución. La conservación de la cordillera de Putaendo significaría el aumento de la representación de ecosistemas frágiles y únicos dentro de las áreas silvestres protegidas de los Andes mediterráneos.

AGRADECIMIENTOS

A Ítalo García, Bárbara Palma, Guillermo Sapaj, Simón Olfos, Sebastián Larrea, Erick y Lucas Lemus, Gamalier Cuevas, hermanos Moreno, Mauricio Quiroz, Vecinxs en Movimiento por el Valle de Putaendo, Fundación Yastay, Simbiosis, por el apoyo en las expediciones. A Vanezza Morales, Nicolás García, Jean-Francois Casale, Nicolás Lavandero, Joel Calvo, Mélica Muñoz-Schick, Víctor Finot, Rafael Urbina-Casanova,

Fernando Gallará, por la identificación de algunas especies y envío de información taxonómica. A Sergio Elórtegui por el material fotográfico. Pablo Mansilla-Quiñones elaboró el mapa del área de estudio. Al Proyecto Flora del valle de Putaendo y Fondecyt Regular 1221879.

REFERENCIAS

- Albesiano, S. 2012. A new taxonomic treatment of the genus *Trichocereus* (Cactaceae) in Chile. *Haseltonia* 18:116-139. <https://dx.doi.org/10.2985/026.018.0114>
- Ambosetti, J., Del Vitto, L., Roig, F. 1986. La vegetación del paso de Uspallata, Provincia de Mendoza, Argentina. *Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zürich* 91: 141-180.
- APG IV. 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Botanical Journal of the Linnean Society* 181: 1-20. <https://doi.org/10.1111/boj.12385>
- Arroyo, M.T., Marquet, A., Marticorena, A., Simonetti, J., Cavieres, L., Squeo, F., Rozzi, R., Massardo, F. 2008. El hotspot chileno, prioridad mundial para la conservación. *Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos*. CONAMA, Santiago, Chile.
- Báez, S., Jaramillo, L., Cuesta, F., Donoso, D. 2016. Effects of climate change on Andean biodiversity: a synthesis of studies published until 2015. *Neotropical Biodiversity* 2: 181-194. <https://doi.org/10.1080/23766808.2016.1248710>
- Bannister, J.R., Vidal, O., Teneb, E., Sandoval, V. 2012. Latitudinal patterns and regionalization of plant diversity along a 4270-km gradient in continental Chile. *Austral Ecology* 37: 500-509. <https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.2011.02312.x>
- Biganzoli, F., Oyarzabal, M., Teillier, S., Zuloaga, F.O. 2022. Fitogeografía de la provincia Altoandina del Cono Sur de Sudamérica. *Darwiniana* 10(2): 537-574. <https://doi.org/10.14522/darwiniana.2022.102.1043>
- Böcher, T.W., Hjerting, J., Rahn, K. 1972. Botanical Studies in the Atuel Valley Area, Mendoza Province, Argentina, Part III. *Dansk Botanisk Arkiv* 22: 195-358.
- Bradshaw, C., Ehrlich, P., Beattie, A., Ceballos, G., Crist, E., Diamond, J., Dirzo, R., Ehrlich, A., Harte, J., Harte, M., Pyke, G., Raven, P., Ripple, W., Saltré, F., Turnbull, C., Wackernagel, M., Blumstein, D. 2021. Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future. *Frontiers in Conservation Science* 1: 615419. <https://doi.org/10.3389/fcosc.2020.615419>
- Braun-Blanquet, J. 1979 *Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales*. Blume, Madrid. 820 pp.
- Cabrera, Á. 1949 El género *Senecio* en Chile. *Lilloa* 15: 27-501.
- Cádiz-Véliz, A., Aliaga-Reyes, C. 2019. Nuevo registro para

- Avellanita bustilloisii* Phil. (Euphorbiaceae) en la Región de Valparaíso, Chile. *Gayana Botánica* 76(2): 253-256. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432019000200253>
- Cádiz-Véliz, A., Palma-Villalobos, B., Villaroel, A.E., Muñoz-Schick, M. 2023. *Adiantum viscosum* (Pteridaceae), a new species endemic to sclerophyllous forest of Central Chile. *Phytotaxa* 599(3): 183-192. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.599.3.5>
- Cádiz-Véliz, A., Román, N., Urbina-Casanova, R., García, N., Palma-Villalobos, B., Sapaj-Aguilera, G. 2022. Rediscovery of *Ivania juncalensis* Al-Shehbaz (Thelypodieae; Brassicaceae), an endemic and threatened species from the Andes of Central Chile. *Phytotaxa* 558(3): 276-282. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.558.3.3>
- Caesar, M., Grandcolas, P., Pellens, R. 2017. Outstanding micro-endemism in New Caledonia: More than one out of ten animal species have a very restricted distribution range. *Plos One* 12(7): e0181437. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181437>
- Cavieres, L., Peñaloza, A., Arroyo, M. T. K. 2000. Altitudinal vegetation belts in the high-Andes of central Chile (33 S). *Revista Chilena de Historia Natural* 73(2): 331-344.
- Cavieres, L., Valencia, G., Hernández, C. 2021. Calentamiento global y sus efectos en plantas de alta-montaña en Chile central: una revisión. *Ecosistemas* 30: 2179-2179. <https://doi.org/10.7818/ECOS.2179>
- Cowling, R., Rundel, P., Lamont, B., Arroyo, M., Arianoutsou, M. 1996. Plant diversity in Mediterranean-climate regions. *Trends in Ecology & Evolution* 11: 362-366. [https://doi.org/10.1016/0169-5347\(96\)10044-6](https://doi.org/10.1016/0169-5347(96)10044-6)
- Cox, R., Underwood, E. 2011. The importance of conserving biodiversity outside of protected areas in Mediterranean ecosystems. *Plos One* 6: e14508. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0014508>
- Cuesta, F., Tovar, C., Llambí, L., Gosling, W., Halloy, S., Carilla, J., Muriel, P., Meneses, R., Beck, S., Ulloa, C., Yager, K., Aguirre, N., Viñas, P., Jácome, J., Suárez-Duque, D., Buytaert, H., Pauli, H. 2020. Thermal niche traits of high alpine plant species and communities across the tropical Andes and their vulnerability to global warming. *Journal of Biogeography* 47: 408-420. <https://doi.org/10.1111/jbi.13759>
- Davies, A. 2010. A systematic revision of *Chaetanthera* Ruiz & Pav. and the reinstatement of *Oriastrum* Poepp. & Endl. (Asteraceae: Mutisieae). Dissertation der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilians-Universität, München. ISBN-13: 978-3838119106; ISBN-10: 383811910X. https://edoc.ub.uni-muenchen.de/11538/1/Davies_Alon.pdf
- Del Vitto, L., Petenatti, E., Muñoz-Schick, M. 1992. Notas sobre la exploración botánica del extremo sur de América. II. El paso de Uspallata o de La Cumbre: viajeros y botánicos entre Argentina y Chile. *Documents Phytosociologiques* 14: 467-488.
- Di Castri, F., Hajek, E.R. 1976. *Bioclimatología de Chile*. Ed. PUC Chile. Santiago, Chile. 128 pp.
- Ehrhart, C. 2000. Die Gattung *Calceolaria* (Scrophulariaceae) in Chile. *Bibliotheca Botanica* 153: 1-283.
- Esquerré, D., Brennan, I., Catullo, R., Torres-Pérez, F., Keogh, J. 2019 How mountains shape biodiversity: The role of the Andes in biogeography, diversification, and reproductive biology in South America's most species-rich lizard radiation (Squamata: Liolaemidae). *Evolution* 73: 214-230. <https://doi.org/10.1111/evo.13657>
- Feeley, K., Silman, M. 2010. Land-use and climate change effects on population size and extinction risk of Andean plants. *Global Change Biology* 16: 3215-3222. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02197>.
- Fernández H., Ferrando, F. 2018. Glaciares rocosos en la zona semiárida de Chile: relevancia de un recurso hídrico sin protección normativa. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía* 27: 338-355. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v27n2.63370>
- Flores-Toro, L. 2012. Estudio fitosociológico de varias áreas disyuntas del norte de la Región de Valparaíso (Chile): sintaxis de la vegetación de Chile mediterráneo y su interés para la conservación. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.
- Flores-Toro, L., Aguirre-Saavedra, F. 2008. Riqueza florística del Santuario de la Naturaleza Palmer El Salto, Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile. *Gayana Botánica* 65: 71-83. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432008000100007>
- Flores-Toro, L., Amigo, J. 2013. Flora autóctona de la cordillera El Melón y del cerro Tabaco, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, Región de Valparaíso, Chile. *Chloris Chilensis* 16.
- Fuentes-Castillo, T., Hernández, H., Pliscoff, P. 2020. Hotspots and ecoregion vulnerability driven by climate change velocity in Southern South America. *Regional Environmental Change* 20: 1-15. <https://doi.org/10.1007/s10113-020-01595-9>
- Fuentes, N., Ugarte, E., Kühn, I., Klotz, S. 2010. Alien plants in southern South America. A framework for evaluation and management of mutual risk of invasion between Chile and Argentina. *Biological Invasions* 12: 3227-3236. <https://doi.org/10.1007/s10530-010-9716-9>
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.
- García, N., Meerow, A. 2020. Corrigendum to: García et al., Generic classification of Amaryllidaceae tribe Hippeastreae [in *Taxon* 68: 481-498. 2019]. *Taxon* 69: 208-209. <https://doi.org/10.1002/tax.12208>

- García, N., Meerow, A., Arroyo-Leuenberger, S., Oliveira, R., Dutilh, J., Soltis, P., Judd, W. 2019. Generic classification of Amaryllidaceae tribe Hippeastreae. *Taxon* 68: 481-498. <https://doi.org/10.1002/tax.12062>
- Garfi, G., Buord, S. 2012. Relict species and the challenges for conservation: the emblematic case of *Zelkova sicula* Di Pasquale, Garfi et Quézel and the efforts to save it from extinction. *Biodiversity Journal* 3: 281-296.
- Giorgis, M., Palchetii, M., Morera, R., Cabido, M., Chiapella, J., Cingolani, A. 2021. Flora vascular de las montañas de Córdoba (Argentina): características y distribución de las especies a través del gradiente altitudinal. *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica* 56: 327-345. <https://doi.org/10.31055/1851.2372.v56.n3.30355>
- Grandjot, G., Grandjot, K. 1936. Der Potrero Grande in der Kordillere von Santiago. *Verhandlungen des Deutschen Wissenschaftlichen Verein zu Santiago de Chile. Neue Folge* 3: 30-66.
- Habel, J., Assmann, T. 2010. Relict Species: Phylogeography and Conservation Biology. Springer-Verlag, Berlín-Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-92160-8>
- Hampe, A., Petit, R. 2005. Conserving biodiversity under climate change: the rear edge matters. *Ecology Letters* 8: 461-467. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00739.x>
- Hartley, A.J., Chong, G. 2002. Late Pliocene age for the Atacama Desert: implications for the desertification of western South America. *Geology* 30 (1): 43-46.
- Hauenstein, E., Muñoz-Pedreros, A., Yáñez, J., Sánchez, P., Möller, P., Guiñez, B., Gil, C. 2009. Flora y vegetación de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Reserva de la Biosfera, Región de Valparaíso, Chile. *Bosque* 30: 159-179. <https://doi.org/10.4067/S0717-92002009000300006>
- Hoffmann, A., Walter, H. 2004. Cactáceas en la Flora Silvestre de Chile. Una guía para la identificación de los cactus que crecen en el país. Segunda edición. Santiago de Chile, Chile: Ediciones Claudio Gay. 307 pp.
- Hughes, C.E., Ringelberg, J.J., Lewis, G.P., Catalano, S.A. 2022. Disintegration of the genus *Prosopis* L. (Leguminosae, Caesalpinoideae, mimosoid clade). *PhytoKeys* 205: 147-189. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.205.75379>
- Kattermann, F. 1994. *Eriosyce* (Cactaceae): The genus revised and amplified. *Succulent Plant Research* 1. Privately published by David Hunt.
- Kiesling, R. 1984. Estudios en Cactaceae de Argentina: *Maihueniopsis*, *Tephrocactus* y géneros afines (Opuntioideae). *Darwiniana* 25: 171-215.
- Korotkova, N., Aquino, D., Arias, S., Eggli, U., Franck, A., Gómez-Hinostrosa, C., Guerrero, P. C., Hernández, H. M., Kohlbecker, A., Köhler, M., Luther, K., Majure, L. C., Müller, A., Metzing, D., Nyffeler, R., Sánchez, D., Schlumpberger, B., Berendsohn, W. G. 2021. Cactaceae at Caryophyllales.org -a dynamic online species-level taxonomic backbone for the family. *Willdenowia* 51: 251-270. <https://doi.org/10.3372/wi.51.51208>
- Luebert, F., Gajardo, R. 2004. Antecedentes sobre la vegetación de la cordillera de los Patos, Andes de Chile central (Región de Valparaíso). *Chloris Chilensis* 7.
- Luebert, F., Muñoz-Schick, M. 2005. Contribución al conocimiento de la flora y vegetación de las dunas de Concón. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural* 54: 11-35.
- Luebert, F., Muñoz-Schick, M., Moreira-Muñoz, A. 2009. Vegetación y flora de La Campana. En: Elórtegui, Moreira-Muñoz, A. (eds.), *Parque Nacional La Campana. Origen de una Reserva de la Biosfera en Chile central*, 2^a ed. Fondo de Las Américas, Chile. 175 pp.
- Luebert, F., Pliscott, P. 2012. Variabilidad climática y bioclimas de la Región de Valparaíso, Chile. *Investigaciones Geográficas* 44: 41-56. <https://doi.org/10.5354/0719-5370.2012.26408>
- Luebert, F., Pliscott, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile: Segunda edición. Editorial universitaria, Santiago, Chile. 381 pp.
- Luebert, F., Weigend, M. 2014. Phylogenetic insights into Andean plant diversification. *Frontiers in Ecology and Evolution* 2: 27. <https://doi.org/10.3389/fevo.2014.00027>
- Lund, R., Teillier, S. 2012. Flora vascular de Los Molles, Región de Valparaíso, Chile. *Chloris Chilensis* 2.
- Maciel-Mata, C., Manríquez-Morán, N., Octavio-Aguilar, P., Sánchez-Rojas, G. 2015. El área de distribución de las especies: revisión del concepto. *Acta Universitaria* 25: 3-19.
- Macluf, C. 2016. Isoetaceae. In: Zuloaga, F.O., Belgrano, M.J. (Eds.) *Flora Vascular de la República Argentina*, pp. 3-9., Vol. 2, Licofitas. Helechos. Gymnospermae, Flora Argentina 2. Editorial del Instituto Darwinion, Buenos Aires.
- Madrid, A. 2019. *Alstroemeria parvula* Phil. (Alstroemeriaceae), una de las especies altoandinas del género en Chile central. *Chloris Chilensis* 22.
- Madrid, A., Larraín, J., Macaya, J., Teillier, S. 2018. Contribución al conocimiento de la flora del Santuario de la Naturaleza Serranía El Ciprés, Región de Valparaíso, Chile. *Gayana Botánica* 75: 589-624. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432018000200589>
- Madrid, A., Teillier, S. 2021. Flora y vegetación de las dunas de la Playa Grande de Cartagena, una playa urbana en Chile central. *Darwiniana, Nueva Serie* 9: 342-363. <https://dx.doi.org/10.14522/darwiniana.2021.92.959>
- Meigen, F. 1893. Skizze der Vegetationsverhältnisse von Santiago in Chile. *Botanische Jahrbücher* 17: 199-294.
- Méndez, E., Martínez, E., Peralta, I. 2006. La vegetación del Parque Provincial Aconcagua (Altos Andes Centrales de

- Mendoza, Argentina). Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica 41: 41-69.
- Mihoc, M., Morrone, J., Negritto, M., Cavieres, L. 2006. Evolución de la serie Microphyllae (Adesmia, Fabaceae) en la Cordillera de los Andes: una perspectiva biogeográfica. Revista Chilena de Historia Natural 79: 389-404. <https://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2006000300009>
- Mittermeier, R., Turner, W., Larsen, F., Brooks, T., Gascon, C. 2011. Global biodiversity conservation: the critical role of hotspots. In Biodiversity hotspots Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20992-5_1
- MMA. 2022. Proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl>
- Monnier, S., Kinnard, C. 2015. Reconsidering the glacier to rock glacier transformation problem: New insights from the central Andes of Chile. Geomorphology 238: 47-55. <https://dx.doi.org/10.1016/J.GEOMORPH.2015.02.025>
- Moreira-Muñoz, A. 2011. Plant geography of Chile (Vol. 5). Springer Science & Business Media. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-8748-5>
- Moreira-Muñoz, A., Scherson, R., Luebert, F., Román, M.J., Monge, M., Diazgranados, M., Silva, H. 2020. Biogeography, phylogenetic relationships and morphological analyses of the South American genus *Mutisia* L.f. (Asteraceae) shows early connections of two disjunct biodiversity hotspots. Organisms Diversity & Evolution 20: 639-656. <https://doi.org/10.1007/s13127-020-00454-z>
- Muiño, W., Prina, A., Alfonso, G. 2012. Flora altoandina de la Reserva Laguna del Diamante (Mendoza, Argentina). Chloris Chilensis 15: 1-89.
- Muñoz-Schick, M., Moreira-Muñoz, A. 2013. Consideraciones taxonómicas y de distribución geográfica de especies chilenas del género *Tropaeolum* L.: *T. reicheanum* Buchenau ex Reiche; *T. looseri* Sparre; *T. leptophyllum* G. Don y *T. myriophyllum* (Poepp. & Endl.) Sparre. Gayana Botánica 70(2): 345-357. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-66432013000200012>
- Muñoz-Schick, M., Moreira-Muñoz, A., Villagrán, C., Luebert, F. 2000. Caracterización florística y pisos de vegetación en los Andes de Santiago, Chile central. Boletín del Museo de Historia Natural 49: 9-50. <https://publicaciones.mnhn.gob.cl/668/w3-article-64447.html>
- Myers, N., Mittermeier, R., Mittermeier, C., Da Fonseca, G., Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858. <https://doi.org/10.1038/35002501>
- Novoa, P. 2016. Informe prospección flora Mina Vizcachitas, sector La Tejas, río Rocín, Putaendo. CONAF, Valparaíso, Chile.
- Novoa, P., Espejo, J., Cisternas, M., Rubio, M., Dominguez, E. 2015. Guía de campo de las orquídeas chilenas. Segunda edición ampliada. Corporación Chilena de la Madera (CORMA), Santiago, Chile. 244 pp.
- Novoa, P., Matus, M. 2013. Flora de la región de Valparaíso (Chile). Patrimonio y estado de conservación. Catálogo documentado y fotográfico. Ed. Fundación Jardín Botánico Nacional. 360 pp.
- Ospina, J., Aliscioni, S., Denham, S. 2015. A revision of *Festuca* (Loliinae, Pooideae, Poaceae) in Chile. Phytotaxa 223: 1-66. <https://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.223.1.1>
- Palmisano, T. 2020. Conflictos socioambientales y territoriales en espacios rurales de la comuna de Putaendo (Chile). Mundo Agrario 21: 151-151. <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.24215/15155994e151>
- Peñaloza, A., Cavieres, L., Arroyo, M.T.K., Torres, C. 2001. Efecto nodriza intra-específico de *Kageneckia angustifolia* D. Don (Rosaceae) sobre la germinación de semillas y sobrevivencia de plántulas en el bosque esclerófilo montano de Chile central. Revista Chilena de Historia Natural 74(3): 539-548.
- Peralta, P., De Romero, M., Denham, S., Botta, S. 2008. Revisión del Género *Junellia* (Verbenaceae). Annals of the Missouri Botanical Garden 95: 338-390. <https://doi.org/10.3417/2004167>
- Pérez-Latorre, A., Cansino-Navas, M., Hidalgo-Triana, H. 2018. Flora vascular relicta de la Serranía de Ronda oriental (Málaga, España). Takurunna: Anuario de Estudios sobre Ronda y La Serranía 8: 51-70.
- Perrigo, A., Hoorn, C., Antonelli, A. 2020. Why mountains matter for biodiversity. Journal of Biogeography 47: 315-325. <https://doi.org/10.1111/jbi.13731>
- Pliscoff, P., Fuentes-Castillo, T. 2008. Análisis de representatividad ecosistémica de las áreas Protegidas públicas y privadas en Chile. Creación de un sistema nacional integral de áreas protegidas para Chile. Informe final, GEF, CONAMA y PNUD, Santiago, Chile.
- Pliscoff, P., Fuentes-Castillo, T. 2011. Representativeness of terrestrial ecosystems in Chile's protected area system. Environmental Conservation 38: 303-311. <https://doi.org/10.1017/S0376892911000208>
- Prina, A., Alonso, G. 2002. La importancia actual de las prospecciones florísticas en biología de conservación. Una experiencia en el árido del centro-oeste de Argentina. Revista Ecosistemas 11(3).
- Quintanilla, V. 1978. El escalonamiento vegetal de Los Andes occidentales a la latitud de Valparaíso (33° S). Investigaciones Geográficas 25: 53-65. <https://doi.org/10.5354/0719-5370.1978.27478>
- Ramírez, C., San Martín, C. 2006. Capítulo II. Diversidad de Macrofitos chilenos. En: Vila, I. (Ed.) Macrofitas y

- vertebrados de los sistemas límnicos de Chile. Editorial Universitaria, Chile. 187 pp.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V.L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P., Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432018000100001>
- San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J., Villaseñor, R. 2001. Flora y vegetación del estero Reñaca (V Región, Chile). *Gayana Botánica* 58: 31-46. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-66432001000100004>
- Sarmiento, F., Vera, F., Juncosa, J., Juncosa, J. 2000. Diccionario de ecología: paisajes, conservación y desarrollo sustentable para Latinoamérica. Abya Yala, Quito, Ecuador.
- Scherson, R., Thornhill, A., Urbina-Casanova, A., Freyman, W., Pliscoff, P., Mishler, B. 2017. Spatial phylogenetics of the vascular flora of Chile. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 112: 88-95. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2017.04.021>
- Seddon, A., Macias-Fauria, M., Long, P., Benz, D., Willis, K. 2016. Sensitivity of global terrestrial ecosystems to climate variability. *Nature* 531: 229-232. <https://doi.org/10.1038/nature16986>
- Señoret, F., Acosta, J. 2013. Cactáceas endémicas de Chile, Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 250 pp.
- Squeo, F., Warner, B., Aravena, R., Espinoza, D. 2006. Bofedales: high altitude peatlands of the central Andes. *Revista Chilena de Historia Natural* 79: 245-255. <https://doi.org/10.4067/S0716-078X2006000200010>
- Teillier, S., Hoffmann, A., Saavedra, F., Pauchard, L. 1994. Flora del Parque Nacional El Morado (Región Metropolitana, Chile). *Gayana Botánica* 51: 13-47.
- Teillier, S., Marticorena, A., Niemeyer, H. 2011. Flora andina de Santiago: guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Santiago, Chile. 478 pp.
- Tovar, C., Melcher, I., Kusumoto, B., Cuesta, F., Cleef, A., Meneses, R., Halloy, S., Llambí, L., Beck, S., Muriel, P., Jaramillo, R., Jácome, R., Carilla, J. 2020. Plant dispersal strategies of high tropical alpine communities across the Andes. *Journal of Ecology* 108: 1910-1922. <https://doi.org/10.1111/1365-2745.13416>
- Urbina-Casanova, R., Saldivia, P., Scherson, R. 2015. Consideraciones sobre la sistemática de las familias y los géneros de plantas vasculares endémicos de Chile. *Gayana Botánica* 72: 272-295. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-66432015000200011>
- Vamosi, J., Wilson, J. 2008. Nonrandom extinction leads to elevated loss of angiosperm evolutionary history. *Ecology Letters* 11: 1047-1053. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2008.01215.x>
- Vanderplank, S.E., Moreira-Muñoz, A., Hobohm, C., Pils, G., Noroozi, J., Clark, V.R., Barker, N.P., Yang, W., Huang, J., Ma, J., Tang, C.Q., Werger, M.J.A., Ohsawa, M., Yang, Y. 2014. Endemism in Mainland Regions-Case Studies: Central Chile Ecoregion. In: Hobohm, C. (Ed.) *Endemism in Vascular Plants. Series Plant and Vegetation* 9, pp. 205-308. Springer, Dordrecht.
- Villagrán, C. 2018. Biogeografía de los bosques subtropical-templados del sur de Sudamérica. hipótesis históricas. *Magallania* 46: 27-48. <https://doi.org/10.4067/S0718-22442018000100027>
- Villagrán, C., Marticorena, C., Armesto, J. 2007. Flora de las plantas vasculares de Zapallar: Revisión ampliada e ilustrada de la obra de Federico Johow. Editorial Puntágeles y Fondo Editorial UMCE, Chile. 646 pp.
- Villaseñor, R. 1980. Unidades fisionómicas y florísticas del Parque Nacional La Campana. *Anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso* 13: 65-70.
- Villaseñor, R., Serey, I. 1980. Estudio fitosociológico de la vegetación del cerro La Campana (Parque Nacional La Campana en Chile central). *Atti dell'Istituto Botanico della Università e Laboratorio Crittogramico di Pavia* 6: 69-91.
- Von Bohlen, C., Ormazábal, C., Peñailillo, P. 2022. Flora de las Palmas de Ocoa y sus alrededores. Eclipse Creativo, Santiago de Chile. 512 pp.
- Walter, H., Guerrero, P. 2022. Towards a unified taxonomic catalogue for the Chilean cacti: assembling molecular systematics and classical taxonomy. *Phytotaxa* 550: 79-98. <https://doi.org/10.11646/phytotaxa.550.2.1>

Received: 11.01.23

Accepted: 17.11.23

GAYANA BOTANICA

Apéndice 1. Lista detallada de la flora vascular de la cordillera de Putaendo/ Detailed list of the vascular flora of the Putaendo mountain range.

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
PTERIDOPHYTA																						
LYCOPODIOPSIDA																						
Isoetaceae	<i>Isoetes sp.</i>	Hidrófita	Muy escasa	A. Cádiz-Véliz 980	-	N									1							
POLYPODIOPSIDA																						
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Hemicriptófita	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	N			1													
Blechnaceae	<i>Blechnum microphyllum</i> (Goldm.) C.V. Morton	Hemicriptófita	Muy escasa	NR	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N					1											
Cystopteridaceae	<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3763, 4259	AYP, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	N			1				1									
Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Hemicriptófita	Frecuente	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N			1													
Equisetaceae	<i>Equisetum pyramidale</i> Goldm.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4183	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E			1													
Pteridaceae	<i>Adiantum glanduliferum</i> Link	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3848, 4132	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N	1	1		1												
Pteridaceae	<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Hemicriptófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	E	1															
Pteridaceae	<i>Adiantum scabrum</i> Kaulf.	Hemicriptófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N	1															
Pteridaceae	<i>Cheilanthes glauca</i> (Cav.) Mett.	Hemicriptófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS	N		1		1		1										

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pteridaceae	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Hemicriptófita	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1									
Pteridaceae	<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) C. Presl	Hemicriptófita	Escasa	NR	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, LLA	N	1									
Pteridaceae	<i>Pellaea myrtillifolia</i> Mett. ex Kuhn	Hemicriptófita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1									
Salviniaceae	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Hidrófita	Ocasional	JBN 3787	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N			1							
PINOPHYTA																
GNETOSIDA																
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Nanofanerófita	Frecuente	JBN 4463	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1		1	1	1				
Ephedraceae	<i>Ephedra gracilis</i> Phil. ex Stapf	Caméfita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME	E	1									
MAGNOLIOPHYTA																
LILIOPSIDA																
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb. var. <i>angustifolia</i>	Geófita	Ocasional	JBN 4169, 4176	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1		1						
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb. var. <i>velutina</i> (Ehr. Bayer) Muñoz-Schick	Geófita	Ocasional	JBN 4129	COQ, VAL, RME	E	1	1		1						
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria pallida</i> Graham	Geófita	Ocasional	JBN 3796	COQ, VAL, RME	E	1	1		1						
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria parvula</i> Phil.	Geófita	Muy escasa	JBN 3749, 4375	VAL, RME	E				1	1					
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria spathulata</i> C. Presl	Geófita	Muy escasa	JBN 3948	VAL, LBO	E		1		1	1					1
Amaryllidaceae	<i>Zephyranthes tenuiflora</i> (Phil.) Nic. García	Geófita	Escasa	JBN 4130, 4492	VAL, RME, LBO, MAU	E				1	1					
Amaryllidaceae	<i>Latace andina</i> (Poepp.) Sasseone fma. andina	Geófita	Ocasional	JBN 3462, 4352	VAL, RME, LBO, LLA	N				1	1	1	1			

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.	Geófita	Escasa	JBN 4471	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E	1	1		1							
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne violaceascens</i> Phil.	Geófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME	E		1		1							
Amaryllidaceae	<i>Phycella ornata</i> (Miers) Nic. García	Geófita	Escasa	JBN 3513, 4192	VAL, RME	E		1		1							
Amaryllidaceae	<i>Tristagma bivalve</i> (Hook. ex Lindl.) Traub	Geófita	Ocasional	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E				1							
Amaryllidaceae	<i>Tristagma nivale</i> Poepp. fma. nivale	Geófita	Muy escasa	JBN 4161	COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA, MAG	N					1						
Bromeliaceae	<i>Puya alpestris</i> (Poepp.) Gay subsp. <i>zoellneri</i> Zizka	Caméfita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E		1									
Cyperaceae	<i>Carex andina</i> Phil.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4426	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N				1	1	1					
Cyperaceae	<i>Carex gayana</i> E. Desv. var. <i>gayana</i>	Hemicriptófita	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG	N		1				1					
Cyperaceae	<i>Carex setifolia</i> Kunze ex Kunth	Hemicriptófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1	1								
Cyperaceae	<i>Eleocharis</i> sp.	Hemicriptófita	Escasa	NR		N			1								
Cyperaceae	<i>Rhodoscirpus asper</i> (J. Presl & C. Presl) Léveillé-Bourret, Donadio & J.R. Starr	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4152, 4319	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N			1								
Cyperaceae	<i>Eleocharis pseudoalbibracteata</i> S. González & Guagl.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4142	TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, IPA	N		1				1					
Cyperaceae	<i>Carex malmei</i> Kalela	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4283	ATA, COQ, VAL, RME	N									1		
Cyperaceae	<i>Carex vallis-pulchrae</i> Phil. var. <i>vallis-pulchrae</i>	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4278	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAG	N								1			

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cyperaceae	<i>Phylloscirpus acaulis</i> (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson	Hemicriptófita	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N			1							
Cyperaceae	<i>Zameioscirpus gaimardioides</i> (E. Desv.) Dhooge & Goetgh.	Hemicriptófita	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, LBO	E									1	
Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. <i>junceum</i>	Geófita	Ocasional	JBN 4336	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG.	N				1	1	1	1	1		
Iridaceae	<i>Olsynium junceum</i> (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt subsp. <i>depauperatum</i> (Phil.) R.A. Rodr. & Martic.	Geófita	Ocasional	NR	COQ, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	E			1	1	1					
Iridaceae	<i>Olsynium philippii</i> (Klatt) Goldblatt subsp. <i>philippii</i>	Geófita	Ocasional	JBN 4312	COQ, VAL, RME, LBO	E			1	1						
Iridaceae	<i>Olsynium scirpoideum</i> (Poepp.) Goldblatt subsp. <i>scirpoideum</i>	Geófita	Ocasional	JBN 4461	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N			1							
Iridaceae	<i>Sisyrinchium arenarium</i> Poepp. subsp. <i>adenostemon</i> (Phil.) Ravenna	Geófita	Ocasional	JBN 4306	VAL, RME, LBO, MAU	N			1	1						
Iridaceae	<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	Geófita	Ocasional	JBN 4248	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1		1						
Iridaceae	<i>Sisyrinchium graminifolium</i> Lindl.	Geófita	Ocasional	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1		1						
Iridaceae	<i>Sisyrinchium striatum</i> Sm.	Geófita	Ocasional	JBN 3712	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N					1					
Iridaceae	<i>Solenomelus segethii</i> (Phil.) Kuntze	Geófita	Muy escasa	JBN 3843	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N								1	1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Juncaceae	<i>Oxychloe bisexualis</i> Kuntze	Hemicriptófita	Muy frecuente	JBN 3653, 3683	COQ, VAL, RME	N								1				
Juncaceae	<i>Patosia clandestina</i> (Phil.) Buchenau	Hemicriptófita	Muy frecuente	JBN 3816, 4361	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA	N								1				
Juncaceae	<i>Juncus cyperoides</i> Laharpe	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4143	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N			1									
Orchidaceae	<i>Chloraea alaris</i> Lindl.	Geófita	Muy escasa	NR	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E				1								
Orchidaceae	<i>Chloraea bletioides</i> Lindl.	Geófita	Muy escasa	JBN 4189	VAL, RME, LBO, MAU, NUB	E				1								
Orchidaceae	<i>Chloraea picta</i> Phil.ex Kraenzl.	Geófita	Escasa	JBN 4453, 4494	COQ, VAL, RME, LBO	N				1								
Poaceae	<i>Bromus berteroanus</i> Colla	Terófita	Frecuente	JBN 4115	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE	N	1				1	1						
Poaceae	<i>Bromus setifolius</i> J. Presl var. <i>pictus</i> (Hook.) Skottsb.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4118, 4280	VAL, RME, MAG	N	1	1		1	1	1						
Poaceae	<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4175, 4180	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, IPA	N			1									
Poaceae	<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P. Beauv. var. <i>caespitosa</i>	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4277	ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N						1						
Poaceae	<i>Deschampsia venustula</i> Parodi	Hemicriptófita	Escasa	NR	VAL, RME, MAU, MAG.	N					1		1					
Poaceae	<i>Deyeuxia chrysostachya</i> E. Desv.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3684, 4276	ANT, COQ, VAL, RME	N									1			
Poaceae	<i>Deyeuxia erythrostachya</i> E. Desv. var. <i>erythrostachya</i>	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4281	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N							1					

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poaceae	<i>Elymus angulatus</i> J. Presl	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4284	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N			1	1	1					
Poaceae	<i>Festuca acanthophylla</i> E. Desv. var. <i>acanthophylla</i>	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4109, 4116	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1	1		1	1	1	1			
Poaceae	<i>Pappostipa chrysophylla</i> (E. Desv.) Romasch.	Hemicriptófita	Muy frecuente	JBN 4286	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1			1	1	1			
Poaceae	<i>Poa obvallata</i> Steud.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4275	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	N					1		1			
Poaceae	<i>Polypogon australis</i> Brongn.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4287	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	N			1							
Poaceae	<i>Trisetum caudulatum</i> Trin.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4285	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.	N	1	1		1						
Poaceae	<i>Trisetum johnstonii</i> (Louis-Marie) Finot subsp. <i>johnstonii</i>	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4279	ATA, COQ, VAL, RME	N								1	1	
Poaceae	<i>Trisetum preslei</i> (Kunth) E. Desv.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4282	ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS.	N								1	1	
Poaceae	<i>Festuca kurtziana</i> St.-Yves	Hemicriptófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, MAU	N								1		
Poaceae	<i>Hordeum chilense</i> Roem. & Schult.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4114	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	N	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poaceae	<i>Hordeum comosum</i> J. Presl	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3844, 4270	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N				1	1	1	1		1	1
Poaceae	<i>Jarava pogonathera</i> (E. Desv.) Peñail.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4117	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU	N	1	1		1						
Poaceae	<i>Melica argenteata</i> E. Desv	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4119	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1		1						
Poaceae	<i>Pappostipa speciosa</i> (Trin. & Rupr.) Romasch.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 113	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG	N	1	1		1	1	1				
Poaceae	<i>Phleum alpinum</i> L.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4242	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N									1	
Poaceae	<i>Polypogon interruptus</i> Kunth	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4112	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, LLA	N			1							
Poaceae	<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4110	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA	A			1							
Poaceae	<i>Festuca panda</i> Sw.	Hemicriptófita	Escasa	ACV 959	AYP, COQ, VAL	N										1
Poaceae	<i>Poa denudata</i> Steud.	Hemicriptófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	E				1		1				
Potamogetonaceae	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner	Hidrófita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, MAU, BIO	N			1							1
Typhaceae	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Hidrófita	Escasa	JBN 4397	TAR, ANT, VAL, NUB, BIO, ARA	N			1							
MAGNOLIOPSIDA																
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Fanerófita	Muy escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	E	1									

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anacardiaceae	<i>Schinus caudellii</i> F.A. Barkley	Fanerófita	Muy escasa	JBN 3687, 4328	VAL, RME, MAU	E				1						
Anacardiaceae	<i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl	Fanerófita	Frecuente	JBN 3656, 3799	VAL, RME, LBO	E		1	1	1						
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.	Fanerófita	Muy frecuente	JBN 4211	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	N	1	1	1	1						
Apiaceae	<i>Apium panul</i> (Bertero ex DC.) Reiche	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4362	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N			1	1						
Apiaceae	<i>Asteriscium aemocarpon</i> Clos	Terófita	Frecuente	JBN 3711, 4486	COQ, VAL, RME, LBO	E					1					
Apiaceae	<i>Asteriscium chilense</i> Cham. & Schltld.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4330	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU,	E	1	1								
Apiaceae	<i>Azorella cryptantha</i> (Clos) Reiche	Caméfita	Ocasional	JBN 3685	ATA, COQ, VAL	N					1					1
Apiaceae	<i>Azorella madrepatica</i> Clos	Caméfita	Frecuente	JBN 4374	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA, NUB, BIO, ARA, LRI	N					1	1				1
Apiaceae	<i>Azorella prolifera</i> (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Caméfita		JBN 3805, 4105, 4124	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG	N			1	1						
Apiaceae	<i>Azorella ruizii</i> G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Caméfita	Muy frecuente	JBN 3811, 4380	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	N				1						
Apiaceae	<i>Azorella trifoliolata</i> Clos	Hemicriptófita	Muy escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	N		1								
Apiaceae	<i>Bowlesia tropaeolifolia</i> Gillies & Hook.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4300	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N				1					1	
Apiaceae	<i>Bowlesia uncinata</i> Colla	Terófita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Terófita	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	A			1							
Apiaceae	<i>Diposis bulbocastanum</i> DC.	Hemicriptófita	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO.	E					1					1
Apiaceae	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i> (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance	Caméfita	Muy frecuente	JBN 3807, 4348	COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1		1	1					
Apiaceae	<i>Homalocarpus dichotomus</i> (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance	Terófita	Ocasional	JBN 4179	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1									
Apiaceae	<i>Homalocarpus nigripetalus</i> (Clos) Mathias & Constance	Terófita	Escasa	JBN 3834	COQ, VAL, RME.	E		1		1	1					
Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	Hidrófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N			1							
Apiaceae	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb.	Hidrófita	Ocasional	NC	VAL, RME, LBO, MAU, BIO	N			1							
Apiaceae	<i>Pozoa coriacea</i> Lag.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3674, 4346	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	N					1	1				1
Apiaceae	<i>Sanicula graveolens</i> Poepp. ex DC.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3791	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS	N				1	1	1			1	1
Apocynaceae	<i>Diplolepis geminiflora</i> (Decne.) Liede & Rapini	Caméfita	Muy escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	E	1	1								
Apocynaceae	<i>Diplolepis mucronata</i> (Decne.) Hechem & C. Ezcurra	Caméfita	Muy escasa	JBN 4271, 4455	COQ, VAL, RME, LBO, NUB	N					1	1				1
Apocynaceae	<i>Diplolepis nummulariifolia</i> (Hook. & Arn.) Liede & Rapini	Caméfita	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N				1	1					
Apocynaceae	<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Caméfita	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	E	1									
Asteraceae	<i>Antennaria chilensis</i> J. Remy var. <i>chilensis</i>	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4251	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG	N								1		

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Asteraceae	<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	Caméfita	Muy escasa	NR	ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	E							1				
Asteraceae	<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4136	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N			1								
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Caméfita	Muy frecuente	JBN 3686, 4219, 4406	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N	1	1	1	1							
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>pycnocephala</i> F.H. Hellwig	Caméfita	Ocasional	NR	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N		1	1	1							
Asteraceae	<i>Baccharis neaei</i> DC.	Caméfita	Frecuente	JBN 3665, 4475	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N			1	1							
Asteraceae	<i>Baccharis poeppigiana</i> DC. subsp. <i>poeppigiana</i>	Caméfita	Frecuente	JBN 3662, 3757, 4120	COQ, VAL, RME.	E			1	1							
Asteraceae	<i>Baccharis sagittalis</i> (Less.) DC.	Caméfita	Ocasional	NR	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N			1								
Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nanofanerófita	Muy frecuente	JBN 3679, 4186	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N			1								
Asteraceae	<i>Calopappus acerosus</i> Meyen	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4370	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E					1		1				
Asteraceae	<i>Chaetanthera chilensis</i> (Willd.) DC. var. <i>chilensis</i>	Hemicriptófita	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N				1							
Asteraceae	<i>Chaetanthera depauperata</i> (Hook. & Arn.) A.M.R. Davies	Terófita	Escasa	JBN 4147, 4464	ATA, COQ, VAL, RME	E		1			1						
Asteraceae	<i>Chaetanthera euphrasioides</i> (DC.) F. Meigen	Terófita	Ocasional	JBN 3765, 4340	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	N		1			1						
Asteraceae	<i>Chaetanthera flabellata</i> D. Don	Terófita	Muy escasa	JBN 3766	VAL, RME, MAU	E		1			1						

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Asteraceae	<i>Chaetanthera glabrata</i> (DC.) F.Meigen	Terófita	Ocasional	JBN 3713, 3741, 4204	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E					1					
Asteraceae	<i>Chaetanthera glandulosa</i> J. Remy var. <i>glandulosa</i>	Caméfita	Ocasional	JBN 3753	COQ, VAL, RME	E		1		1						
Asteraceae	<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp. ex Less.	Terófita	Frecuente	JBN 3840, 4187	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1								
Asteraceae	<i>Chaetanthera moenchioides</i> Less.	Terófita	Muy frecuente	JBN 4421, 4454	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N	1	1			1					
Asteraceae	<i>Chaetanthera schroederi</i> G.F. Grandjot & K.Grandjot	Terófita	Ocasional	JBN 4106, 4438	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	E				1	1	1				
Asteraceae	<i>Chaetanthera spathulifolia</i> Cabrera	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3735, 4378	COQ, VAL	N					1	1		1	1	
Asteraceae	<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don	Caméfita	Muy frecuente	JBN 3694, 4323	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	N				1	1	1	1			
Asteraceae	<i>Conyza arabidifolia</i> J. Remy	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4303	VAL, RME, LBO	E	1	1								
Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist var. <i>bonariensis</i>	Terófita	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	N	1									
Asteraceae	<i>Conyza gayana</i> Phil.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4324	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	E		1								
Asteraceae	<i>Erigeron andicola</i> DC.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4240	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, MAG	N							1			
Asteraceae	<i>Erigeron leptopetalus</i> Phil.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3671, 3776	ATA, COQ, RME, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG.	N								1		
Asteraceae	<i>Gamochaeta americana</i> (Mill.) Wedd.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4466	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	N			1					1		

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Asteraceae	<i>Gamochaeta filaginea</i> (DC.) Cabrera	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4308	VAL, RME, MAU, NUB, BIO	N	1		1							
Asteraceae	<i>Haplopappus</i> sp.	Caméfita	Escasa	NR		E							1			
Asteraceae	<i>Haplopappus anthylloides</i> Meyen & Walp.	Caméfita	Frecuente	NR	VAL, RME, LBO, MAU	N					1					
Asteraceae	<i>Haplopappus arbutooides</i> J. Remy	Caméfita	Muy frecuente	JBN 4205, 4358	COQ, VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1		1						
Asteraceae	<i>Haplopappus multifolius</i> Phil. ex Reiche subsp. <i>multifolius</i>	Caméfita	Frecuente	JBN 4201	COQ, VAL, RME.	N	1	1			1					
Asteraceae	<i>Haplopappus ochagavianus</i> Phil.	Caméfita	Escasa	JBN 3846	COQ, VAL, RME	E										
Asteraceae	<i>Haplopappus pinnatifidus</i> Nutt.	Caméfita	Muy escasa	JBN 4490	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	E		1								
Asteraceae	<i>Haplopappus pusillus</i> Klin-genb.	Caméfita	Muy escasa	JBN 4313, 4467	COQ, VAL, RME	N				1						
Asteraceae	<i>Haplopappus scrobiculatus</i> (Nees) DC.	Caméfita	Frecuente	JBN 3832, 4171	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N			1	1	1					
Asteraceae	<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	Caméfita	Escasa	JBN 4322	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1								
Asteraceae	<i>Haplopappus undulatus</i> Klingenberg.	Caméfita	Ocasional	JBN 4200, 4373	COQ, VAL, RME	E	1	1		1						1
Asteraceae	<i>Hypochaeris acaulis</i> (J. Remy) Britton	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 3672	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA.	N										
Asteraceae	<i>Hypochaeris chondrilloides</i> (A. Gray) Cabrera	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3933	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.	N				1	1					1
Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i> L.	Terófita	Ocasional	NR	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	A	1	1	1							
Asteraceae	<i>Leucheria bridgesii</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3969	COQ, VAL, RME, LBO	E				1	1	1				
Asteraceae	<i>Leucheria congesta</i> D. Don	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4376	COQ, VAL, RM	N				1		1				
Asteraceae	<i>Leucheria floribunda</i> DC.	Hemicriptófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N										1
Asteraceae	<i>Leucheria hieracioides</i> Cass.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4137, 4320	VAL, RME, LBO, MAU.	E			1							

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Asteraceae	<i>Leucheria rosea</i> Poepp. ex Less.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4139	VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1		1						
Asteraceae	<i>Leucheria runcinata</i> D. Don	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3688, 4138	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N							1			
Asteraceae	<i>Leucheria salina</i> (Remy) Dusen	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4377	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N							1	1		
Asteraceae	<i>Leucheria tenuis</i> Less.	Terófita	Muy escasa	JBN 4134, 4168	COQ, VAL, RME, LBO, ARA	E	1	1								
Asteraceae	<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche	Terófita	Ocasional	JBN 4188	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	E	1	1								
Asteraceae	<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Terófita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	E	1	1								
Asteraceae	<i>Mutisia acerosa</i> Less.	Caméfita	Frecuente	JBN 3793, 4196	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N				1	1	1				
Asteraceae	<i>Mutisia cana</i> Poepp.	Nanofanerófita	Escasa	JBN 3839, 4410	ATA, COQ, VAL, RME.	E	1	1	1							
Asteraceae	<i>Mutisia ilicifolia</i> Hook. var. <i>decandolleana</i> (Phil. ex Reiche) Cabrera	Nanofanerófita	Frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E		1	1	1						
Asteraceae	<i>Mutisia rosea</i> Poepp. ex Less.	Nanofanerófita	Ocasional	JBN 3801, 4428, 4479	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E	1	1								
Asteraceae	<i>Mutisia sinuata</i> Cav.	Caméfita	Frecuente	JBN 3814, 3842, 4203	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	N				1	1	1	1			
Asteraceae	<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav. fma. <i>rosmarinifolia</i> (Poepp. & Endl.) Cabrera	Caméfita	Frecuente	JBN 4398	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N				1	1	1				
Asteraceae	<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav. fma. <i>subulata</i>	Caméfita	Frecuente	JBN 4403	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N				1	1	1				
Asteraceae	<i>Nardophyllum chiliotrichoides</i> (J. Remy) A. Gray	Caméfita	Muy frecuente	JBN 3764, 4269	COQ, VAL, RME, LBO	N				1	1	1	1			
Asteraceae	<i>Nardophyllum lanatum</i> (Meyen) Cabrera	Caméfita	Ocasional	JBN 4299	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E						1				
Asteraceae	<i>Nassauvia aculeata</i> (Less.) Poepp. & Endl. var. <i>aculeata</i>	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3968	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG	N						1			1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Asteraceae	<i>Nassauvia axillaris</i> (Lag. ex Lindl.) D. Don	Caméfita	Escasa	JBN 3963	COQ, VAL, RME	N					1					
Asteraceae	<i>Nassauvia cumingii</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4233	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N					1	1	1			
Asteraceae	<i>Nassauvia pyramidalis</i> Meyen	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3652, 3825	VAL, RME, LBO, MAU, BIO.	N					1					
Asteraceae	<i>Nassauvia revoluta</i> D. Don	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3738	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N								1	1	
Asteraceae	<i>Nassauvia uniflora</i> (D. Don) Hauman	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 3817, 4379	COQ, VAL, RME	N					1	1				
Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook.ex B.D. Jacks.	Caméfita	Escasa	JBN 4347	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	E	1	1								
Asteraceae	<i>Oriastrum apiculatum</i> (J. Remy) A.M.R. Davies	Terófita	Escasa	JBN 4368	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.	N								1	1	
Asteraceae	<i>Oriastrum gnaphaloides</i> (J. Remy) Wedd.	Terófita	Escasa	JBN 3748	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	N									1	
Asteraceae	<i>Oriastrum lycopodioides</i> (J. Remy) Wedd.	Terófita	Ocasional	JBN 3836	COQ, VAL, LBO	N								1	1	
Asteraceae	<i>Oriastrum pusillum</i> Poepp. & Endl.	Terófita	Muy escasa	JBN 4476	COQ, VAL, RME	E					1					
Asteraceae	<i>Pachylaena atriplicifolia</i> D. Don ex Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3736, 4483	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N				1				1		
Asteraceae	<i>Perezia carthamoides</i> (D. Don) Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3737, 4245	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N				1			1	1	1	
Asteraceae	<i>Perezia poeppigii</i> Less.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3833, 4266	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E				1	1					
Asteraceae	<i>Plectocephalus chilensis</i> (Bertero ex Hook. & Arn.) G. Don ex Loudon	Nanofanerófita	Muy escasa	JBN 4417	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1									
Asteraceae	<i>Plectocephalus floccosus</i> (Hook. & Arn.) N.García & Susanna.	Nanofanerófita	Muy escasa	JBN 4404	ATA, COQ, VAL	E	1	1								
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>Cinerea</i> (Phil.) Luebert	Nanofanerófita	Ocasional	JBN 4468	ATA, COQ, VAL, RME, MAU	E	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Nanofanerófita	Muy frecuente	JBN 4367	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N	1	1										
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium cymatoides</i> (Kunze ex DC.) Anderb.	Terófita	Escasa	JBN 4342	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N			1									
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4315, 4405	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, LLA, AIS, MAG	E			1									
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4418	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N	1											
Asteraceae	<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4448	COQ, VAL, RME	E	1	1										
Asteraceae	<i>Senecio anthemidiphylloides</i> J. Rémy	Caméfita	Frecuente	JBN 4141, 4177	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N				1	1							
Asteraceae	<i>Senecio crithmoides</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3701	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N										1	1	
Asteraceae	<i>Senecio davilae</i> Phil.	Caméfita	Muy escasa	JBN 4174	VAL, RME	E				1	1							
Asteraceae	<i>Senecio donianus</i> Hook. & Arn.	Caméfita	Escasa	JBN 4223	COQ, VAL, RME	N				1								
Asteraceae	<i>Senecio eruciformis</i> J. Remy	Nanofanerófita	Frecuente	JBN 3975	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO	N			1									
Asteraceae	<i>Senecio farinifer</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4360	COQ, VAL, RME, MAU	E				1								
Asteraceae	<i>Senecio glaber</i> Less.	Nanofanerófita	Muy frecuente	JBN 3973, 4170	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS	N			1									
Asteraceae	<i>Senecio hakeifolius</i> Bertero ex DC. var. <i>hakeifolius</i>	Caméfita	Ocasional	JBN 4409	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1		1								
Asteraceae	<i>Senecio jungei</i> Phil.	Caméfita	Muy escasa	JBN 4274	COQ, VAL	E	1											
Asteraceae	<i>Senecio laetevirens</i> Phil.	Caméfita	Escasa	JBN 3700	VAL, RME	N											1	1
Asteraceae	<i>Senecio looseri</i> Cabrera	Caméfita	Escasa	JBN 4239	COQ, VAL, RM	N												1

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Asteraceae	<i>Senecio microphyllus</i> Phil.	Caméfita	Ocasional	JBN 4296, 4408	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1		1	1						
Asteraceae	<i>Senecio pissisi</i> Phil.	Caméfita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL	N										1	
Asteraceae	<i>Senecio polygaloides</i> Phil.	Caméfita	Ocasional	JBN 3768	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS	N					1	1					
Asteraceae	<i>Solidago chilensis</i> Meyen	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4366	TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, RME, LBO, MAU,	N			1								
Asteraceae	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. <i>baccharoides</i> (D.Don ex Hook. & Arn.) G.Sancho	Fanerófita	Ocasional	JBN 4399, 4474	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1									
Asteraceae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Hemicriptófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	A	1	1	1								
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Hemicriptófita	Escasa	NR	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA	A			1						1		
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Nanofanerófita	Frecuente	JBN 4108	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N			1								
Asteraceae	<i>Triptilion capillatum</i> (D. Don) Hook. & Arn.	Terófita	Escasa	JBN 3771	COQ, VAL, RME, LBO	N	1	1									
Asteraceae	<i>Werneria pygmaea</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3667, 3974	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME.	N										1	
Asteraceae	<i>Hypochaeris clarionoides</i> (J. Remy) Reiche	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4272	COQ, VAL, RME, MAU	N						1				1	
Asteraceae	<i>Nassauvia lagascae</i> (D. Don) F. Meigen var. <i>lagascae</i>	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4332	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LRI, MAG	N											1
Asteraceae	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Terófita	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1									

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Terófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE	A	1										
Asteraceae	<i>Haplopappus integrerrimus</i> (Hook. & Arn.) H.M. Hall	Caméfita	Muy escasa	A. Cádiz-Véliz 979	COQ, VAL, RME	E	1	1									
Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn. var. <i>chilensis</i>	Nanofanerófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E	1	1									
Berberidaceae	<i>Berberis empetrifolia</i> Lam.	Caméfita	Muy frecuente	JBN 3804	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO,	N				1	1	1			1		
Berberidaceae	<i>Berberis montana</i> Gay	Caméfita	Muy frecuente	JBN 3677, 4295	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS.	N				1	1	1					
Bignoniaceae	<i>Argylia adscendens</i> DC. var. <i>adscendens</i>	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3818, 4484	COQ, VAL, RME, LBO.	E						1	1				
Bignoniaceae	<i>Eccremocarpus scaber</i> Ruiz & Pav.	Nanofanerófita	Escasa	JBN 3794	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N		1	1	1							
Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Terófita	Frecuente	JBN 4440	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N	1	1									
Boraginaceae	<i>Cryptantha dimorpha</i> (Phil.) Greene	Terófita	Ocasional	NR	ATA, COQ, VAL, RME	E	1	1			1						
Boraginaceae	<i>Cryptantha glomerata</i> Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. <i>glomerata</i>	Terófita	Ocasional	JBN 4146, 4339	TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, NUB, BIO, ARA	E			1								
Boraginaceae	<i>Cryptantha involucrata</i> (Phil.) Reiche	Terófita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME	E										1	
Boraginaceae	<i>Cryptantha</i> sp.	Hemicriptófita	Muy escasa	NR		N				1							
Boraginaceae	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Hemicriptófita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	A						1					
Boraginaceae	<i>Pectocarya linearis</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Terófita	Frecuente	JBN 3493	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, AIS	A	1	1									

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Boraginaceae	<i>Phacelia brachyantha</i> Benth.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4150	COQ, VAL, RME, LBO, MAG	N	1	1		1		1			1	
Boraginaceae	<i>Phacelia cumingii</i> (Benth.) A. Gray	Terófita	Frecuente	JBN 4199	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N	1	1		1						
Boraginaceae	<i>Phacelia pinnatifida</i> Griseb. ex Wedd.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 3778	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL	N					1					
Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel. var. <i>secunda</i>	Hemicriptófita	Muy frecuente	JBN 3788, 4490	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	N	1	1		1	1	1				
Boraginaceae	<i>Plagiobothrys myosotoides</i> (Lehm.) Brand	Terófita	Frecuente	JBN 4125, 4470	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N		1		1						
Boraginaceae	<i>Cryptantha capituliflora</i> (Clos) Reiche	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4230	COQ, VAL, RME.	N									1	1
Brassicaceae	<i>Cardamine</i> sp.	Hemicriptófita	Muy escasa	NC		N			1						1	
Brassicaceae	<i>Descurainia erodiifolia</i> (Phil.) Prantl ex Reiche	Terófita	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, MAU	N			1	1						
Brassicaceae	<i>Descurainia nuttallii</i> (Colla) O.E. Schulz	Terófita	Frecuente	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, LLA, MAG.	N	1	1								
Brassicaceae	<i>Descurainia pimpinellifolia</i> (Barnéoud) O.E. Schulz	Terófita	Frecuente	JBN 4123	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N				1						
Brassicaceae	<i>Draba gilliesii</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4263	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.	N									1	
Brassicaceae	<i>Draba pusilla</i> F. Phil.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4333	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG	N										1
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Terófita	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, BIO, ARA, JFE, IPA	A	1	1								
Brassicaceae	<i>Lepidium</i> sp.	Hemicriptófita	Muy escasa	NR		N			1							
Brassicaceae	<i>Menonvillea flexuosa</i> Phil.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4193,4194	ATA, COQ, VAL, RME	E				1						1

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brassicaceae	<i>Menonvillea scapigera</i> (Phil.) Rollins subsp. <i>longipes</i> (Rollins) Prina	Hemicriptófita	Muy escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N				1					1	
Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Hemicriptófita	Frecuente	NR	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	A			1							
Brassicaceae	<i>Schizopetalon dentatum</i> (Barnéoud) Gilg & Muschl.	Terófita	Escasa	JBN 4354	ATA, COQ, VAL, RME	E				1						
Brassicaceae	<i>Schizopetalon walkeri</i> Sims	Terófita	Escasa	JBN 4478	COQ, VAL	E		1		1						
Brassicaceae	<i>Sisymbrium irio</i> L.	Terófita	Escasa	NR	AYP, ANT, ATA, VAL, RME, LBO, MAU, MAG	A	1	1		1	1					
Brassicaceae	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Terófita	Escasa	NR	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, MAG	A		1		1						
Cactaceae	<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Bac-keb. var. <i>aurata</i>	Caméfita	Ocasional	JBN 3470	ATA, COQ, VAL, RME	E	1	1		1	1					
Cactaceae	<i>Leucostele chiloensis</i> subsp. <i>eburneus</i> (Phil. ex K.Schum.) Schlumpb.	Fanerófita	Frecuente	NR	COQ, VAL	E	1	1								
Cactaceae	<i>Maihueniopsis glomerata</i> (Haw.) R. Kiesling	Caméfita	Muy escasa	JBN 3663	ANT, ATA, COQ, VAL	N					1					
Cactaceae	<i>Maihueniopsis ovata</i> (Pfeiff.) F. Ritter	Caméfita	Ocasional	JBN 3734	VAL, RME	N		1		1	1	1				
Cactaceae	<i>Eriosyce</i> sp. 1	Caméfita	Escasa	NR	VAL	E	1	1			1					
Cactaceae	<i>Eriosyce</i> sp. 2	Caméfita	Escasa	NR	VAL	E		1			1	1				
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> var. <i>acon-</i> <i>caguensis</i> (F.Ritter) Katt.	Caméfita	Escasa	NR	VAL	E				1	1					
Calceolariaceae	<i>Calceolaria andina</i> Benth.	Caméfita	Escasa	JBN 4267	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E					1					
Calceolariaceae	<i>Calceolaria arachnoidea</i> Graham subsp. <i>nubigena</i> (Poepp.) C. Ehrh.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3813, 4302	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E		1		1	1					
Calceolariaceae	<i>Calceolaria ascendens</i> Lindl. subsp. <i>glandulifera</i> (Witasek) C. Ehrh.	Caméfita	Escasa	JBN 3714	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Calceolariaceae	<i>Calceolaria cana</i> Cav.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4492	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E				1			1		1		
Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>mimuloides</i> (Clos) C. Ehrh.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4273	COQ, VAL, RME	E							1				
Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>santiagina</i> C. Ehrh.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4159	VAL, RME, LBO	E		1		1							
Calceolariaceae	<i>Calceolaria densifolia</i> Phil. subsp. <i>densifolia</i>	Caméfita	Frecuente	JBN 3758	COQ, VAL	N				1	1						
Calceolariaceae	<i>Calceolaria densifolia</i> Phil. subsp. <i>laxa</i> C. Ehrh.	Caméfita	Frecuente	JBN 4165	VAL, RME	E				1	1						
Calceolariaceae	<i>Calceolaria filicaulis</i> Clos subsp. <i>luxurians</i> (Witasek) C. Ehrh.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3810	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N			1					1			
Calceolariaceae	<i>Calceolaria flavovirens</i> C. Ehrh.	Caméfita	Muy escasa	NR	ATA, COQ, VAL	E				1							
Calceolariaceae	<i>Calceolaria glandulosa</i> Poepp. ex Benth. subsp. <i>alcahuensis</i> (Muñoz-Schick) C. Ehrh.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4452	COQ, VAL	E	1	1									
Calceolariaceae	<i>Calceolaria glandulosa</i> Poepp. ex Benth. subsp. <i>glandulosa</i>	Hemicriptófita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1									
Calceolariaceae	<i>Calceolaria hypericina</i> Poepp. ex Benth	Caméfita	Frecuente	JBN 3784, 4133, 4144	COQ, VAL, RME, LBO	E				1	1	1					
Calceolariaceae	<i>Calceolaria meyeniana</i> Phil. subsp. <i>meyeniana</i>	Caméfita	Muy escasa	JBN 4318	VAL, RME, LBO, MAU, ARA	E		1									
Calceolariaceae	<i>Calceolaria petiolaris</i> Cav.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4307	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E			1								
Calceolariaceae	<i>Calceolaria pinifolia</i> Cav.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4260	ATA, COQ, VAL	N										1	
Calceolariaceae	<i>Calceolaria polifolia</i> Hook.	Caméfita	Ocasional	JBN 3792, 4202	COQ, VAL, RME, LBO	E									1	1	
Calceolariaceae	<i>Calceolaria purpurea</i> Graham	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3785, 4436	VAL, RME, LBO, MAU	E		1		1	1						
Calceolariaceae	<i>Calceolaria segethii</i> Phil.	Caméfita	Frecuente	JBN 4131, 4166	COQ, VAL, RME	E				1	1						

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Calyceraceae	<i>Calycera eryngioides</i> J. Remy	Terófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO	E						1				
Calyceraceae	<i>Calycera herbacea</i> Cav. var. <i>herbacea</i>	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3703	COQ, VAL, RME, MAU, ARA	N										1
Calyceraceae	<i>Calycera sessiliflora</i> Phil.	Terófita	Ocasional	JBN 3710, 4491	COQ, VAL, RME	E	1	1		1	1					
Calyceraceae	<i>Nastanthus scapigerus</i> (J. Remy) Miers	Hemicriptófita	Escasa	NR	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, MAG	N										1
Calyceraceae	<i>Moschopsis leyboldii</i> Phil.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4337	VAL, RME	N										1 1
Campanulaceae	<i>Lobelia oligophylla</i> (Wedd.) Lammers	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3739, 4217	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N			1						1	
Caprifoliaceae	<i>Valeriana graciliceps</i> Clos	Caméfita	Escasa	JBN 3705, 4343, 4400	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E										
Caprifoliaceae	<i>Valeriana stricta</i> Clos	Caméfita	Muy frecuente	JBN 4451	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N										
Caprifoliaceae	<i>Valeriana</i> sp.	Hemicriptófita	Muy escasa	NR		N										
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpens</i> Kunth	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3707, 3770	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N										
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> L.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4253, 4497	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	A			1	1	1	1				
Caryophyllaceae	<i>Cerastium humifusum</i> Cambess.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4254	ANT, COQ, VAL, RME, AIS, MAG	N		1								1
Caryophyllaceae	<i>Colobanthus quitensis</i> (Kunth) Bartl.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3632	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N									1	
Caryophyllaceae	<i>Microphyes minima</i> (Miers ex Colla) Briq.	Terófita	Muy escasa	JBN 4487	COQ, VAL, RME, NUB, BIO	E				1	1					

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Caryophyllaceae	<i>Spergula depauperata</i> (Naudin) Pedersen	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4246	VAL, RME, NUB, ARA, LLA	N					1		1		1	
Caryophyllaceae	<i>Spergula pissisi</i> (Phil.) Volponi	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3704, 4338	ATA, COQ, VAL	N							1			1
Caryophyllaceae	<i>Stellaria chilensis</i> Pedersen	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4298	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	E		1	1	1						
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Fanerófita	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1	1	1	1						
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium philippianum</i> Aellen	Terófita	Muy frecuente	JBN 3693, 4163	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N		1			1	1				
Chenopodiaceae	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clements	Hemicriptófita	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IDE	N	1	1	1							
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Hemicriptófita	Frecuente	NR	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE	A		1		1	1					
Convolvulaceae	<i>Convolvulus bonariensis</i> Cav.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4208	VAL, RME	N	1	1				1				
Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis</i> Pers	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3851, 4149	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	E	1	1								
Convolvulaceae	<i>Convolvulus demissus</i> Choisy	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4268	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N					1					
Convolvulaceae	<i>Convolvulus hermanniae</i> L'Hér.	Hemicriptófita	Muy escasa	NR	COQ, VAL, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1								
Convolvulaceae	Cuscuta sp.	Parásita	Frecuente	NR		N				1	1					
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Fanerófita	Frecuente	JBN 3658	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	N	1	1	1							

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>illinita</i>	Fanerófita	Escasa	JBN 3850	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	E			1								
Escalloniaceae	<i>Escallonia myroidea</i> Bertero ex DC.	Fanerófita	Frecuente	JBN 3678	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N			1								
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	Nanofanerófita	Muy frecuente	JBN 3789, 4498	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, AIS, MAG	N		1		1							
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Nanofanerófita	Frecuente	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E	1										
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja salicifolia</i> Gillies & Hook.	Nanofanerófita	Muy frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E				1							
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia collina</i> Phil. var. <i>collina</i>	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4128	COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG	N	1	1		1							
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia germainii</i> Phil.	Terófita	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME	E				1	1						
Euphorbiaceae	<i>Chropetalum berterianum</i> Schiltl. var. <i>berterianum</i>	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4305	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA	E	1	1		1							
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Hemicriptófita	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, IPA.	N	1										
Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Fanerófita	Muy frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N	1	1									
Fabaceae	<i>Adesmia aegiceras</i> Phil.	Caméfita	Ocasional	NR	TAR, ATA, COQ, VAL, RME	N				1	1						
Fabaceae	<i>Adesmia aspera</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4290	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	N				1	1						
Fabaceae	<i>Adesmia bracteata</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 3692	ATA, COQ, VAL, RME.	E	1	1		1							
Fabaceae	<i>Adesmia capitellata</i> (Clos) Hauman	Terófita	Escasa	JBN 4231	ATA, COQ, VAL, RME	N										1	1
Fabaceae	<i>Adesmia conferta</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E			1	1							

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Nanofanerófita	Frecuente	JBN 4446	COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1								
Fabaceae	<i>Adesmia echinus</i> C. Presl	Caméfita	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, MAU	N					1	1	1			
Fabaceae	<i>Adesmia exilis</i> Clos	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4434	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1								
Fabaceae	<i>Adesmia gracilis</i> Meyen ex Vogel	Caméfita	Escasa	JBN 4402	COQ, VAL, RME, MAU.	N				1	1					
Fabaceae	<i>Adesmia hemisphaerica</i> Hauman	Caméfita	Ocasional	JBN 3666, 3680	TAR, ANT, COQ, VAL, RME	N						1		1		
Fabaceae	<i>Adesmia pinifolia</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Nanofanerófita	Frecuente	JBN 3676	VAL, RME	N			1		1					
Fabaceae	<i>Adesmia subterranea</i> Clos	Caméfita	Ocasional	JBN 3655, 4371	ATA, COQ, VAL	N					1		1		1	1
Fabaceae	<i>Adesmia viscosa</i> Bertero ex Colla	Hemicriptófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E			1							
Fabaceae	<i>Anarthrophyllum andicolum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) F.Phil.	Caméfita	Ocasional	JBN 3659	VAL, RME, LBO	E					1	1				
Fabaceae	<i>Anarthrophyllum cumingii</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	Caméfita	Ocasional	JBN 3827, 4310	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E					1	1				
Fabaceae	<i>Anarthrophyllum gayanum</i> (A. Gray) B.D. Jacks.	Caméfita	Escasa	JBN 3660, 3752	COQ, VAL, RME	N			1				1		1	
Fabaceae	<i>Astragalus berterianus</i> (Morris) Reiche	Terófita	Escasa	JBN 4293	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	E	1	1		1						
Fabaceae	<i>Astragalus cruckshanksii</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Hemicriptófita	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N										
Fabaceae	<i>Astragalus looseri</i> I.M. Johnst.	Hemicriptófita	Frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N				1	1					
Fabaceae	<i>Astragalus pehuenchensis</i> Nie-derl.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3675	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N					1			1	1	
Fabaceae	<i>Astragalus sp.</i>	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4288		N					1			1		1
Fabaceae	<i>Astragalus vesiculosus</i> Clos	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4264	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N				1				1	1	
Fabaceae	<i>Lathyrus subandinus</i> Phil.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4154, 4289	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E			1	1						

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fabaceae	<i>Lupinus microcarpus</i> Sims	Terófita	Escasa	JBN 4317	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N	1	1		1							
Fabaceae	<i>Neltuma chilensis</i> (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis	Fanerófita	Escasa	NR	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N	1										
Fabaceae	<i>Senna arnottiana</i> (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby	Caméfita	Escasa	JBN 3682, 3740	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N				1	1	1					
Fabaceae	<i>Trifolium polymorphum</i> Poir.	Hemicriptófita	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N									1		
Fabaceae	<i>Trifolium vestitum</i> D. Heller & Zohary	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3746	COQ, VAL, RME	N										1	
Fabaceae	<i>Vicia nigricans</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3775, 4321	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N				1							
Francoaceae	<i>Viviania crenata</i> (Hook.) G. Don	Caméfita	Ocasional	JBN 4412	COQ, VAL, RME, LBO	E	1										
Francoaceae	<i>Viviania marifolia</i> Cav.	Caméfita	Frecuente	JBN 4216, 4407	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N		1		1	1	1					
Francoaceae	<i>Balbisia gracilis</i> (Meyen) Hunz. & Ariza	Caméfita	Frecuente	JBN 3786, 4365	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS	N				1	1	1					
Gentianaceae	<i>Centaurium cachanlahuen</i> (Molina) B.L. Rob.	Terófita	Muy escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	N				1							
Gentianaceae	<i>Gentiana prostrata</i> Haenke	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3691	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG	N										1	
Gentianaceae	<i>Gentianella multicaulis</i> (Gil- lies ex Griseb.) Fabris	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 3670, 4232	ATA, COQ, VAL	N										1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit. ex Aiton	Terófita	Frecuente	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	A	1	1		1						
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Terófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	A	1	1								
Geraniaceae	<i>Geranium berteroanum</i> Colla	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4386	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1	1								
Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4325	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	N		1								
Grossulariaceae	<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn.	Caméfita	Ocasional	JBN 3648, 4250	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N							1			
Haloragaceae	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Hidrófita	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1						1			
Lamiaceae	<i>Stachys gilliesii</i> Benth.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4126, 4265	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	E			1	1	1		1			
Lamiaceae	<i>Stachys macraei</i> Benth.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4388	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	E	1	1								
Lamiaceae	<i>Stachys philippiana</i> Vatke	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4206	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA	E			1		1				1	
Lamiaceae	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Caméfita	Ocasional	JBN 4387	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	E	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Loasaceae	<i>Caiophora coronata</i> (Gillies ex Arn.) Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4372	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME	N							1		1	1
Loasaceae	<i>Loasa floribunda</i> Hook. & Arn.	Terófita	Ocasional	JBN 3935, 4191	COQ, VAL, RME.	E	1	1								
Loasaceae	<i>Loasa insons</i> Poepp.	Terófita	Muy frecuente	JBN 4155	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1		1	1					
Loasaceae	<i>Loasa pallida</i> Gillies ex Arn.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3845	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E				1	1					1
Loasaceae	<i>Loasa placei</i> Lindl.	Terófita	Ocasional	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1									
Loasaceae	<i>Mentzelia albescens</i> (Gillies ex Arn.) Griseb.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4148, 4212	ATA, COQ, VAL, RME.	N	1									
Loasaceae	<i>Scyphanthus elegans</i> Sweet	Terófita	Frecuente	JBN 3835, 4210	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E	1	1								
Loasaceae	<i>Blumenbachia dissecta</i> (Hook. & Arn.) Weigend & Grau	Hemicriptófita	Muy escasa	A. Cádiz-Véliz 976	VAL, RME, LBO, MAU	N				1						
Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Parásita	Frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, NUB	N	1									
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Parásita	Frecuente	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO.	E	1	1								
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Parásita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	N			1							
Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	Parásita	Muy frecuente	JBN 3681, 4363	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N	1	1		1						
Lythraceae	<i>Pleurophora polyandra</i> Hook. & Arn.	Terófita	Frecuente	JBN 3699	COQ, VAL, RME, LBO.	E	1	1								
Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i> D. Don	Caméfita	Ocasional	JBN 4184	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1		1						
Malvaceae	<i>Corynabutilon ceratocarpum</i> (Hook. & Arn.) Kearney	Nanofanerófita	Muy escasa	JBN 3823	VAL, RME, LBO	E				1						
Malvaceae	<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn. var. <i>dissecta</i>	Terófita	Ocasional	JBN 4301	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Malvaceae	<i>Nototrichie compacta</i> (A. Gray) A.W. Hill	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4335	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N										1
Malvaceae	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i> (Hook.) G. Don	Caméfita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, ARA	E	1	1								
Montiaceae	<i>Calandrinia affinis</i> Gillies ex Arn.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4262	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1									
Montiaceae	<i>Calandrinia caespitosa</i> Gillies ex Arn.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4261	ATA, COQ, VAL, RME, MAU, ARA, MAG	N										1
Montiaceae	<i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC.	Terófita	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N	1									
Montiaceae	<i>Cistanthe arenaria</i> (Cham.) Carolin ex Hershkovitz	Terófita	Frecuente	JBN 4416	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N	1	1								
Montiaceae	<i>Cistanthe frigida</i> (Barnèoud) Peralta	Hemicriptófita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME	N										1 1
Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Schltdl.	Hemicriptófita	Ocasional	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E	1	1								
Montiaceae	<i>Cistanthe picta</i> (Gillies ex Arn.) Carolin ex Hershkovitz	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3932	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N			1	1	1					1
Montiaceae	<i>Montiopsis andicola</i> (Gillies) D.I. Ford	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4243	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N										1 1
Montiaceae	<i>Montiopsis capitata</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Terófita	Ocasional	JBN 4419	AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS	N	1	1		1						
Montiaceae	<i>Montiopsis gilliesii</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Hemicriptófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N				1	1	1				
Montiaceae	<i>Montiopsis potentilloides</i> (Barnéoud) D.I. Ford	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4341	COQ, VAL, RME	N				1						
Montiaceae	<i>Montiopsis ramosissima</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Terófita	Frecuente	JBN 4420	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1	1		1						
Montiaceae	<i>Montiopsis sericea</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3936, 4160	COQ, VAL, RME, MAU, NUB	E	1	1		1	1	1				

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Montiaceae	<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Terófita	Muy frecuente	JBN 4411	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1	1		1						
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis ovata</i> (Ruiz & Pav.) F. Meigen	Hemicriptófita	Ocasional	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N	1									
Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche subsp. <i>dentata</i>	Terófita	Ocasional	JBN 4209, 4423	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS	N	1									
Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis subsp. <i>tenella</i>	Terófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N	1	1								
Onagraceae	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	Hemicriptófita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N			1							
Onagraceae	<i>Epilobium denticulatum</i> Ruiz & Pav.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3657	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, BIO	N			1							
Onagraceae	<i>Epilobium glaucum</i> Phil.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4316	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N			1							
Onagraceae	<i>Epilobium puberulum</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4415	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N			1							
Onagraceae	<i>Gayophytum humile</i> A. Juss.	Terófita	Ocasional	JBN 3937, 4225	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	N				1	1					1
Onagraceae	<i>Gayophytum micranthum</i> Hook. & Arn.	Terófita	Ocasional	JBN 3934	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N					1					1
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P.H. Raven subsp. <i>montevi- densis</i> (Spreng.) P.H. Raven	Hidrófita	Escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.	N			1							
Onagraceae	<i>Oenothera acaulis</i> Cav.	Hemicriptófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	E	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Onagraceae	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4135	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA	N		1		1						
Oxalidaceae	<i>Oxalis cinerea</i> Zucc.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4291	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA	N									1	
Oxalidaceae	<i>Oxalis compacta</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Terófita	Frecuente	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO	N									1	
Oxalidaceae	<i>Oxalis hypsophila</i> Phil.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4237	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N									1	
Oxalidaceae	<i>Oxalis megalorrhiza</i> Jacq.	Hemicriptófita	Escasa	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	N	1	1								
Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Terófita	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE	N	1									
Oxalidaceae	<i>Oxalis penicillata</i> Phil.	Hemicriptófita	Frecuente	NR	VAL, RME, LBO	N					1	1	1			
Oxalidaceae	<i>Oxalis</i> sp.	Terófita	Muy escasa	NR		N				1						
Papaveraceae	<i>Argemone hunnemannii</i> Otto & A. Dietr.	Terófita	Ocasional	JBN 4385	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1								
Passifloraceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>humilis</i>	Terófita	Frecuente	JBN 3798, 4437	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, MAU	N	1	1								
Passifloraceae	<i>Malesherbia linearifolia</i> (Cav.) Pers.	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4185	COQ, VAL, RME, LBO.	E	1	1		1					1	
Passifloraceae	<i>Malesherbia lirana</i> Gay var. <i>lirana</i>	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3822, 4122	ANT, ATA, COQ, VAL, RME.	N			1	1	1		1		1	
Phrymaceae	<i>Erythranthe depressa</i> (Phil.) G.L. Nesom var. <i>depressa</i>	Hidrófita	Escasa	JBN 3651	ANT, ATA, COQ, VAL	E		1					1			
Phrymaceae	<i>Erythranthe glabrata</i> (Kunth) G.L. Nesom	Hidrófita	Escasa	JBN 3782, 4326	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	N		1						1		

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Phrymaceae	<i>Erythranthe lutea</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>lutea</i>	Hidrófita	Ocasional	JBN 3463, 3759, 4327	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N			1					1			
Phytolaccaceae	<i>Anisomeria coriacea</i> D. Don	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3649	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E					1		1		1		
Plantaginaceae	<i>Melosperma andicola</i> Benth.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3809	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N					1	1	1				
Plantaginaceae	<i>Plantago australis</i> Lam. subsp. <i>cumingiana</i> (Fisch. & C.A.Mey.) Rahn	Hidrófita	Escasa	JBN 4121	VAL, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N			1								
Plantaginaceae	<i>Plantago barbata</i> G. Forst. subsp. <i>barbata</i>	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4249	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N								1			
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Terófita	Frecuente	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	E	1	1									
Plantaginaceae	<i>Stemodia durantifolia</i> (L.) Sw. var. <i>chilensis</i> (Benth.) C.C.Cowan	Hidrófita		NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N			1								
Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Hidrófita	Frecuente	JBN 4424	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE	A			1								
Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i> (Ruiz & Pav.) Brand	Terófita	Muy escasa	JBN 4357, 4432	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1	1		1							
Polemoniaceae	<i>Gilia crassifolia</i> Benth.	Terófita	Frecuente	JBN 3947, 4164	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N	1	1		1	1	1					
Polemoniaceae	<i>Microsteris gracilis</i> (Hook.) Greene	Terófita	Ocasional	JBN 4429	AYP, TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG, JFE	N	1	1			1	1	1		1	1	
Polemoniaceae	<i>Polemonium micranthum</i> Benth.	Terófita	Ocasional	JBN 4158, 4214	COQ, VAL, RME, AIS, MAG	N	1	1		1	1						

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Polygalaceae	<i>Monnina philippiana</i> Chodat	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3824	COQ, VAL, RME, LBO	N	1	1										
Polygonaceae	<i>Chorizanthe paniculata</i> Benth.	Caméfita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO	E	1											
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>has-tulata</i>	Nanofanerófita	Ocasional	NR	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N	1	1		1								
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i> Gay	Hidrófita	Frecuente	NR	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	A			1									
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Hemicriptófita	Ocasional	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE	A	1	1										
Polygonaceae	<i>Rumex magellanicus</i> Campd.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 3654	COQ, VAL, AIS, MAG.	N									1			
Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	Terófita	Muy escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	E	1											
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Terófita	Escasa	NR	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA	A	1											
Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i> Cav. var. <i>repens</i> (d'Urv.) Knuth	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4351	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N			1						1			
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Fanerófita	Frecuente	JBN 4198	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	E	1	1	1									
Ranunculaceae	<i>Barneoudia major</i> Phil.	Hemicriptófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO	N								1	1	1	1	

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Ranunculaceae	<i>Halerpestes cymbalaria</i> (Pursh) Greene	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4396	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, AIS, MAG	N			1									
Ranunculaceae	<i>Myosurus apetalus</i> Gay	Terófita	Ocasional	JBN 4252	COQ, VAL, RME, MAG	N								1				
Ranunculaceae	<i>Ranunculus peduncularis</i> Sm.	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4247	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG	N			1				1					
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos	Caméfita	Ocasional	JBN 4345	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N	1											
Rhamnaceae	<i>Ochetophila nana</i> (Clos) J. Kellerm., Medán & Aagesen	Caméfita	Escasa	JBN 3646	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N							1			1		
Rhamnaceae	<i>Ochetophila trinervis</i> (Gillies ex Hook.) Poepp. ex Miers	Fanerófita	Frecuente	JBN 3802, 4218	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS	N			1									
Rhamnaceae	<i>Retanilla stricta</i> Hook. & Arn.	Nanofanerófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E	1											
Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Fanerófita	Muy frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	E	1	1										
Rosaceae	<i>Acaena leptacantha</i> Phil.	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 3769	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	N								1				
Rosaceae	<i>Acaena magellanica</i> (Lam.) Vahl	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4309	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.	N							1	1	1	1		
Rosaceae	<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 3634, 4197	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	N	1	1		1	1	1						
Rosaceae	<i>Acaena splendens</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Muy frecuente	JBN 3838	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N				1	1	1						

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rosaceae	<i>Kageneckia angustifolia</i> D. Don	Fanerófita	Frecuente	JBN 3797, 4162	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	E				1						
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Nanofanerófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE	A	1									
Rosaceae	<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze	Caméfita	Muy frecuente	JBN 3806, 4472	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N	1			1	1	1	1			
Rubiaceae	<i>Crukshanksia hymenodon</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3628, 3819	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	N				1	1					
Rubiaceae	<i>Crukshanksia palmae</i> Clos	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3800	COQ, VAL, RME	N				1	1	1	1		1	
Rubiaceae	<i>Galium eriocarpum</i> Bartl. ex DC.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4414	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N				1	1					
Rubiaceae	<i>Galium philippianum</i> Dempster	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3808	COQ, VAL, RME, LBO	E										1
Rubiaceae	<i>Galium suffruticosum</i> Hook. & Arn.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4304	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N			1	1						
Rubiaceae	<i>Galium gilliesii</i> Hook. & Arn. subsp. <i>gilliesii</i>	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 4344	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N					1	1		1		
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Fanerófita	Ocasional	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	N		1								
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Fanerófita	Escasa	NR	COQ, RME, NUB, BIO, ARA, JFE	A			1							
Sapindaceae	<i>Guindilia trinervis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	Nanofanerófita	Muy frecuente	JBN 3837, 4491	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N			1	1	1		1			
Schoepfiaceae	<i>Arjona patagonica</i> Hombr. & Jacq. ex Decne.	Hemicriptófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, LBO, NUB, ARA, MAG	N				1	1	1		1		
Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense</i> Molina	Parásita	Ocasional	JBN 3828, 4207	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	N	1	1		1	1		1			
Scrophulariaceae	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Nanofanerófita	Escasa	JBN 3647	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	N			1							

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze	Hemicriptófita	Escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N	1	1								
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Nanofanerófita	Frecuente	NR	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.	N	1	1								
Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Nanofanerófita	Frecuente	JBN 3830, 4153	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N	1	1	1	1						
Solanaceae	<i>Jaborosa caulescens</i> Gillies & Hook. var. <i>caulescens</i>	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4244	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, MAU.	N							1	1		
Solanaceae	<i>Jaborosa lacinidata</i> (Miers) Hunz. & Barboza	Hemicriptófita	Escasa	JBN 3952	ATA, COQ, VAL, RME, MAU	N							1	1		
Solanaceae	<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero var. <i>chilense</i>	Nanofanerófita	Ocasional	NR	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N	1	1								
Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i> (Graham) Hook. var. <i>acuminata</i>	Hemicriptófita	Frecuente	JBN 4431	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	N	1	1		1	1					
Solanaceae	<i>Nicotiana corymbosa</i> J.Remy	Terófita	Frecuente	JBN 4450	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG	N	1	1		1	1	1				
Solanaceae	<i>Salpiglossis sinuata</i> Ruiz & Pav.	Hemicriptófita	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	N	1	1								
Solanaceae	<i>Schizanthus alpestris</i> Poepp.	Terófita	Ocasional	JBN 3826, 4127	ATA, COQ, VAL, RME	E		1		1	1	1	1		1	
Solanaceae	<i>Schizanthus hookeri</i> Gillies ex Graham	Terófita	Frecuente	JBN 3650, 3829	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA	N				1	1	1	1		1	
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Caméfita	Ocasional	JBN 4107	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE.	N	1	1	1	1						
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum azureum</i> Bertero ex Colla	Geófita	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME	E	1	1								
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum looseri</i> Sparre	Geófita	Escasa	NR	COQ, VAL	E	1	1		1						

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum polyphyllum</i> Cav.	Geófita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N						1			1	
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum sessilifolium</i> Poepp. & Endl.	Geófita	Escasa	JBN 3821	COQ, VAL, RME, LBO	E				1	1		1			
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	Geófita	Frecuente	JBN 4151	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	E	1	1								
Urticaceae	<i>Urtica gracilis</i> Aiton subsp. <i>mollis</i> (Steud.) Weigend	Hemicriptófita	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, ARA, LLA, AIS, MAG	N			1							
Verbenaceae	<i>Diostea juncea</i> (Gillies & Hook.) Miers	Nanofanerófita	Frecuente	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	N			1	1						
Verbenaceae	<i>Glandularia berteroii</i> (Schauer) Muñoz-Schick	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4477	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA	E				1					1	
Verbenaceae	<i>Glandularia sulphurea</i> (D. Don) Schnack & Covas var. <i>sulphurea</i>	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4145	ATA, COQ, VAL, RME, ARA	N	1	1								
Verbenaceae	<i>Junellia lavandulaefolia</i> (Phil.) Moldenke	Caméfita	Ocasional	NR	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	E				1	1					
Verbenaceae	<i>Junellia origenes</i> (Phil.) N. O'Leary & P. Peralta	Hemicriptófita	Escasa	NR	ANT, ATA, COQ, VAL	N					1					
Verbenaceae	<i>Junellia spathulata</i> (Gillies & Hook.) Moldenke var. <i>spathulata</i>	Caméfita	Frecuente	JBN 3820, 4292	COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N				1	1	1				
Verbenaceae	<i>Junellia trifurcata</i> (Phil.) Moldenke	Hemicriptófita	Muy escasa	JBN 4258	VAL, RME	E					1		1			1
Verbenaceae	<i>Junellia uniflora</i> (Phil.) Moldenke	Caméfita	Muy escasa	NR	ATA, COQ, VAL, RME, MAU	N										1
Verbenaceae	<i>Mulguraea scoparia</i> (Gillies & Hook.) N. O'Leary & P. Peralta	Nanofanerófita	Frecuente	JBN 3812, 4297	COQ, VAL, RME	N			1	1						
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Hemicriptófita	Ocasional	NR	AYP, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.	N	1	1								

Clase/Orden/ Familia	Taxa	Forma de vida	Frecuencia	Colecta de herbario	Distribución en Chile	Ori- gen	Unidades de Vegetación									
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Violaceae	<i>Viola atropurpurea</i> Leyb.	Hemicriptófita	Escasa	NR	VAL, RME, LBO, MAU	N						1				1
Violaceae	<i>Viola domeykoana</i> Gay	Terófita	Escasa	JBN 3661, 3709	ATA, COQ, VAL, RME, LBO	N								1	1	1
Violaceae	<i>Viola montagnei</i> Gay var. <i>montagnei</i>	Hemicriptófita	Ocasional	JBN 3668, 3733	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	N									1	1
Violaceae	<i>Viola philippii</i> Leyb.	Hemicriptófita	Escasa	JBN 4234, 4413	VAL, RME, LBO, MAU	N						1		1	1	
Violaceae	<i>Viola pusilla</i> Poepp.	Terófita	Ocasional	JBN 4444	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO	E	1	1								
Violaceae	<i>Viola subandina</i> J.M. Watson	Terófita	Escasa	JBN 3783, 4190	VAL, RME, LBO, MAU, NUB	N				1	1	1				
Zygophyllaceae	<i>Larrea nitida</i> Cav.	Nanofanerófita	Ocasional	JBN 3803, 3815	ATA, COQ, VAL, RME	N	1	1								
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Nanofanerófita	Muy escasa	NR	COQ, VAL, RME, LBO	E	1									

Distribución en las regiones de Chile: Arica y Parinacota = AYP, Tarapacá = TAR, Antofagasta = ANT, Atacama = ATA, Coquimbo = COQ, Valparaíso = VAL, Metropolitana de Santiago = RME, Libertador Bernardo O'Higgins = LBO, Maule = MAU, Ñuble = NUB, Biobío = BIO, Araucanía = ARA, Los Ríos = LRI, Los Lagos = LLA, Aisén = AIS, Magallanes = MAG. Unidades de vegetación: (1) Bosque espinoso de *Neltuma chilensis* y *Vachellia caven* (1100-1500 m), (2) Matorral espinoso de *Trevoa quinquenervia* y *Adesmia confusa* (1500-2000 m), (3) Bosque esclerófilo de quebradas (1100-2200 m), (4) Bosque esclerófilo de *Kageneckia angustifolia* (1900-2100 m), (5) Matorral bajo de *Chuquiraga oppositifolia* (2000-2500 m), (6) Matorral espinoso de *Adesmia pinifolia* (2500-2700 m), (7) Matorral bajo pulvinado de *Azorella ruizii* y *Berberis empetrifolia* (2500-3100 m), (8) Vegas de juncáceas (> 2600 m), (9) Desierto de los acarreos (> 2700 m), (10) Matorral-pajonal de *Azorella madreporica* y *Pappostipa chrysophylla* (> 3100 m). El 1 indica la presencia de la especie. Colecta de herbario: No recolectada= NR, Herbario Jardín Botánico Nacional= JBN. Origen: Nativa= N, Endémica= E, Alóctona= A. / Distribution in the Chilean regions: Arica and Parinacota = AYP, Tarapacá = TAR, Antofagasta = ANT, Atacama = ATA, Coquimbo = COQ, Valparaíso = VAL, Santiago Metropolitan = RME, Libertador Bernardo O'Higgins = LBO, Maule = MAU, Ñuble = NUB, Biobío = BIO, Araucanía = ARA, Los Ríos = LRI, Los Lagos = LLA, Aisén = AIS, Magallanes = MAG. Vegetation units: (1) Bosque espinoso of *Neltuma chilensis* and *Vachellia caven* (1100-1500 m), (2) Matorral espinoso of *Trevoa quinquenervia* and *Adesmia confusa* (1500-2000 m), (3) Bosque esclerófilo of quebradas (1100-2200 m), (4) Bosque esclerófilo of *Kageneckia angustifolia* (1900-2100 m), (5) Matorral bajo of *Chuquiraga oppositifolia* (2000-2500 m), (6) Matorral espinoso of *Adesmia pinifolia* (2500-2700 m), (7) Matorral bajo pulvinado of *Azorella ruizii* and *Berberis empetrifolia* (2500-3100 m), (8) Vegas of juncáceas (> 2600 m), (9) Desierto of los acarreos (> 2700 m), (10) Matorral-pajonal of *Azorella madreporica* and *Pappostipa chrysophylla* (> 3100 m). The 1 indicates the presence of the species. Herbarium collection: Not collected= NR, National Botanical Garden Herbarium= JBN. Origin: Native= N, Endemic= E, Allochthonous= A.